

極小水（NPIW）が形成・維持されているというもの（Reid, 1965; Talley, 1993），もう1つは，続流下の塩分極小水の一部が東進途中に黒潮前線を越えて北上する事で塩分極小水が形成・維持されているというもの（Yasuda et al., 1996）である。これら2つの説の妥当性を検証する為に，観測船によって得られたデータを解析した。

観測は2隻の観測船によって行われた。1つは東北水研所属の「若鷹丸」によるもの，もう1つは中央水研所属の「蒼鷹丸」によるものである。若鷹丸は1998年7月に37°N線上の141°E-165°E間を航行，各観測点ごとに水深1500 dbarまでのCTD-RMS, LADCP (Lowered Acoustic Doppler Current Profiler) による連続した直接流向・流速値を測定した。蒼鷹丸は1998年5月に本州東方沖を広域に観測した。そこで得られたデータより，黒潮水と親潮水の混合比を計算する際に使用する典型的黒潮・親潮水それぞれのT-Sダイヤグラムを決定した。

混合水域に属する37°N線下の水は黒潮水と親潮水が

等密度面混合した混合水であるとする。NPIWの密度層である26.6-27.5 σ_0 において，37°N線を横切る親潮水の南北流量がわかれれば，その親潮水が北側（親潮前線を越えて）又は南側（黒潮続流から）のどちらからやって来てNPIW（低塩分性）を維持しているのかがわかる。親潮水の割合は37°N線上の各観測点間・各0.1 σ_0 間隔の密度層において，典型的黒潮・親潮水のT-Sダイヤグラムを用いて求めた。これにLADCP・LADCPによる調整地衡流それぞれから算出された流量を掛けて親潮水南北流量を導出した。

計算の結果，1998年7月37°N線上141°E-165°E区間での26.6-27.5 σ_0 層を通過する親潮水量は，北向きにそれぞれ2.10(LADCP) Sv・3.06(調整地衡流)Svとなった。この結果より，混合水域のNPIWは黒潮続流下に存在する塩分極小水が北上することで形成・維持されている事が示唆された。

41°30'N線における冬期の平均場からのアノマリーと親潮および津軽暖流水の強弱

中村 こず恵・三宅 秀男
北海道大学大学院水産学研究科

親潮は水温場では春季に最も南下する事が知られているが，係留系による親潮の直接測流の結果では2月に最大となる（Uehara et al., 1997）。そこで，本研究では冬季の2月に注目して地衡流量の大小から親潮の強い年，弱い年を決定し，両者の海洋構造の違いを調べた。

用いたデータは，1989-1997年の函館海洋気象台高風丸による41°30'N定期観測線上のCTD水温，塩分の基準層データである。これらのデータから，ポテンシャル水温，ポテンシャル密度を計算し，約10年間にわたる41°30'N断面の平均場，アノマリー，地衡流量などを求めた。ここで親潮の流れを143°40'Eから144°40'Eの南下流と定義して，親潮の地衡流量が大きい年を親潮の強い年，小さい年を弱い年とした。

親潮の強い年（92年，96年）の断面構造の特徴は144°00'Eを中心にして表層に低温・低塩水が広く分布していた。さらに，143°40'E-144°Eの区間を中心とする塩分，密度の水平勾配が大きく，その勾配は深くまで達し

ていた。一方，弱い年では，強い年にくらべ表層は高温で，143°40'E-144°Eの区間を中心とする塩分，密度の水平勾配は小さかった。

このような両者の海洋構造の違いの原因を調べるために，親潮の強い年，弱い年の水温，塩分，密度の10年間の平均場からのアノマリーを計算した。密度場のアノマリーから，親潮の強い年は144°Eを境として西側（岸側）でより軽く，東側（沖側）でより重たくなっていることが分かった。水温場のアノマリーでは，両者に差がないのに対し，塩分場のアノマリーでは，やはり144°Eを境として西側でより低塩，東側でより高塩化している。

このことから144°E付近の密度の水平勾配は塩分に起因している。したがって，親潮の強弱には岸よりの低塩分水が寄与していると考えられる。

今後は，もっと詳しく見ていって定量的に議論し，低塩分の要因を探りたい。

北海道南方41°30'N線におけるプランクトンの親潮域での長期変動について

高野 宏之
函館海洋気象台

1972年春季～1999年春季に動・植物プランクトンを41°30'N線の142°E～147°Eの1°毎に観測した。その観測データと各層観測時の水温・密度等との関係から，動物プランクトン湿重量・けい藻の総細胞数等の日変化・季節変化・経年変化について調査した。

日変化は，動物プランクトン湿重量について，秋・冬を中心に夜間に多く，昼間に少ない傾向がみられた。植物プランクトンについては，はっきりしなかった。

季節変化は，動・植物プランクトンとともに春に多く，夏がその次に多い傾向がみられた。けい藻の総細胞数は，