新しいドパミン作動薬を用いた
プロラクチン分泌調節機構の解析

太田 昭彦

①

新しいドパミン作動薬を用いた
プロラクチン分泌調節機構の解析

東京大学大学院農学系研究科
畜産獣医学専門課程博士課程
太田昭彦

指導教官

東京大学教授

高橋 迪 雄

目次

第1章 下垂体PRL分泌に対するOPC-4392の直接作用	1
I はじめに	2
II 材料と方法	6
1. 動物	6
2. 下垂体前葉細胞の浮遊化と培養	6
1) 下垂体前葉細胞の浮遊化	6
2) 細胞数および生存率の測定	7
3) 下垂体前葉細胞の培養	7
3. 静置培養	8
1) インキュベーションメディアウムの調整	8
2) インキュベーション	9
4. PRLの測定	9
5. 統計	9
III 結果	10
1. 下垂体培養細胞のPRL分泌に対するOPC-4392の影響	10
2. ハロペリドールの下垂体培養細胞のPRL分泌に対する影響	10
3. OPC-4392のPRL分泌抑制に対する ハロペリドールの効果	11
4. DA、アポモルフィンのPRL分泌抑制に対する OPC-4392の効果	11

IV 考察	12
図表	18
第2章 Superfusionを用いたOPC-4392の PRL分泌動態に対する検討	27
I はじめに	27
II 材料と方法	31
1. マイクロキャリアの調整	31
2. 細胞の浮遊化とマイクロキャリアへの付着	31
3. 灌流液の調製	32
4. Superfusion	32
5. PRLの測定	34
III 結果	35
1. Superfusion法による下垂体培養細胞のPRL分泌に及ぼす OPC-4392、DA、CB-154の効果	35
1) 予備的検討	35
2) OPC-4392 10^{-5} MのPRL分泌に対する影響	35
3) DA 10^{-5} MのPRL分泌に対する影響	36
4) CB-154 10^{-5} MのPRL分泌刺激に対する影響	36

2. OPC-4392、DA、CB-154のTRHによる PRL分泌刺激に対する影響	36
IV 考察	38
図表	42
第3章 生体におけるOPC-4392による PRL分泌調節系の解析	
I はじめに	51
II 材料と方法	56
1. 動物	56
2. 他家下垂体移植ラット (isograftラット) の作出	56
3. 自家下垂体移植ラット (autograftラット) の作出	57
4. 偽妊娠ラットの作出	57
5. レゼルピン投与ラット	57
6. 正常雄ラット、レゼルピン投与ラット、isograftラット、 autograftラットへのOPC-4392あるいは3-ppp の投与	57
7. 偽妊娠ラットへのOPC-4392、CB-154の投与	59
8. 採血	60
9. ホルモン測定	60
10. 統計	60

III 結果	61
1. 正常雄ラットの血中PRL濃度に対する	
OPC-4392の効果	61
1) OPC-4392の経口投与、断頭採血による	
PRL濃度への効果	61
2) OPC-4392の静脈内投与、尾静脈採血による	
血中PRL濃度への効果	61
2. レゼルピン投与正常雄ラットにおけるOPC-4392の	
血中PRL濃度に対する効果	62
3. 下垂体移植ラットにおけるOPC-4392、3-pppの	
血中PRL濃度に対する効果	62
1) AutograftラットにおけるOPC-4392の	
血中PRL濃度に対する効果	63
2) Autograftラットにおける3-pppの	
血中PRL濃度に対する効果	63
3) IsograftラットにおけるOPC-4392の	
血中PRL濃度に対する効果	64
4) レゼルピン投与isograftラットにおける	
OPC-4392の血中PRL濃度に対する効果	64
4. OPC-4392あるいはCB-154の	
偽妊娠維持に対する影響	65
5. 偽妊娠ラットにおけるPRLダイアーナルサージ、	
ノクターナルサージに対するOPC-4392の効果	65
1) ダイアーナルサージに対するOPC-4392の効果	66
2) ノクターナルサージに対するOPC-4392の効果	66

IV 考察	68
図表	79
第4章 総括	93
謝辞	99
文献	100

第 1 章下垂体 P R L に対する

OPC-4392 の直接作用

1. はじめに

下垂体前葉からは、黄体形成ホルモン(LH)、卵胞刺激ホルモン(FSH) 甲状腺刺激ホルモン(TSH)、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)、成長ホルモン(GH)、プロラクチン(PRL)の少なくとも6種のホルモンが分泌されている。*in vitro*で下垂体前葉を培養すると他の下垂体前葉ホルモンとは異なりPRL分泌は昂進すること(Pasteels, 1961)、ラット下垂体前葉を腎被膜下に移植すると移植下垂体からのPRL分泌の増大によって偽妊娠が成立すること(Everett et al., 1954)、視床下部と下垂体を連絡する下垂体柄の切断(Kanematsu and Sawyer, 1973)、視床下部腹内側核の破壊(Butler et al., 1975)によって血中PRL濃度の上昇がみられること、視床下部抽出物中にPRL分泌抑制活性があること(Talwalker et al., 1963)等より、PRL分泌は、他の下垂体ホルモンとは異なり、中枢(視床下部)からの分泌抑制支配を受けていることが示される。隆起漏斗系ドバミン(TIDA)ニューロンは、弓状核の神経細胞体より正中隆起外層に線維を延ばし、下垂体門脈周囲に神経終末をつくる(Fuxe, 1963)。下垂体門脈には他の末梢血に比べて高濃度のドバミン(DA)が存在すること(Ben-Jonathan et al., 1977)、 α -メチルp-エーロシンを投与して、DA合成を阻止すると脳内DAは減少し、血中PRL濃度が上昇するが、この上昇は生理的濃度のDAである程度抑制できること(Gibbs and Neill, 1978)、*in vitro*でも門脈で認められるものに相当する濃度のDAで下垂体からのPRL分泌を減少させられること(Shaar and Leheyer, 1974)、DAレセプターが下垂体前葉に存在すること(Caron et al., 1977; Cronin et al., 1978)、ラット乳房神経の電気刺激によってPRL分泌を上昇させた際に、門脈中のDA濃度が低下すること等(Neill, 1980)から、視床下部PRL放出抑

制因子 (P I F) の主体は、D A であり、P R L 分泌調節において D A が第 1 義的役割をもっているものと考えられている (Ben-Jonathan, 1985)。

一方、D A ニューロンは、T I D A ニューロン以外にも広く脳内に分布し (Hokfelt et al., 1984)、運動機能や、情動等の精神活動に重要な役割を果たしているとされる (田中と白川, 1985)。また、D A レセプターは、脳内や、下垂体以外にも副甲状腺 (Brown et al., 1980)、血管系 (Brodde, 1982)、消化管 (Kusunoki et al., 1985) 等に分布し、それらの器官の生理作用に対して D A が関与していることが示唆されている。

D A レセプターにはサブタイプが存在し、現在広く受け入れられている Keabian と Calne (1979) による分類では、アデニレートサイクラーゼ活性に促進的に共役しているものを D 1 レセプター、アデニレートサイクラーゼ活性に無関係または、抑制的に共役しているものを D 2 レセプターとしている。また、神経細胞における局在と機能によって、D A ニューロン自身に存在し、D A ニューロンの活動をショートフィードバック的に抑制するオートレセプターと D A ニューロンがシナプスするニューロンに存在するシナプス後レセプターとに分類される (Roth, 1979)。

抗精神病薬の多くが D A アンタゴニストであり、とくに D 2 レセプターとの親和性と薬効との間に高い相関が認められ (Seeman, 1981)、精神分裂病の D A 仮説 (Van Rossum, 1966; Losonczy et al., 1987; Seeman P, 1987) が支持されている。すなわち、中脳辺縁系および中脳皮質系 D A ニューロンの異常な活動により分裂病が誘起され、抗精神病薬が、これらの部位のシナプス後 D 2 レセプターにおいて D A に拮抗することで症状が改善するものとされている。一般の抗精神病薬は、他の部位の D A レセプターにも作用を及ぼし、黒質線条体への作用によっては、錐体外路系副作用、いわゆるパーキンソン病様症状や、下垂体への D A アンタゴニスト作用によっては、高 P R L 血症による乳漏症、不

妊症などの副作用を起こすことが知られている (Richelson, 1980; Kannan, 1987)。

7-[3-[4-(2,3-dimethylphenyl)piperadiny]propoxy]-2(1H)-quinolinone (OPC-4392) は、D2レセプターに選択性を持ち、オートレセプターには、アゴニストとして、しかしシナプス後D2レセプターにはアゴニストとして作用せず、むしろアンタゴニストとして作用すること (Kiuchi et al., 1987; Yasuda et al., 1988)、すなわち、主にDAニューロンそのものの活動を抑制させるという新しい考えをもとに抗精神病薬として開発中の薬剤である。血中PRL濃度上昇と抗精神病としての薬効にも強い相関が認められるとの報告 (Meltzer and Fang, 1976; Langer et al., 1977) もあり、OPC-4392が、PRL分泌にどの程度影響を及ぼすかは、臨床上極めて重要な問題であり、開発者はこの問題に強い関心を寄せた。

一般に、DAアゴニストは、*in vivo*、*in vitro*で下垂体のPRL分泌を低下させ、一方、DAアンタゴニストは、*in vivo*で血中PRL濃度を上昇させ、*in vitro*では、DAによる下垂体細胞のPRL分泌抑制に拮抗する。これらのことは、DAがPRL分泌をDAレセプターを介して制御していることの間接的な証拠でもあり、またこれらの薬剤がPRL分泌機序の解析や、PRLそのものの生理作用の解明に大きく貢献してきた由縁である (Dohler and Witke, 1974; MacLoad, 1976; Gudelsky and Porter, 1980)。

著者は、従来のDAアゴニストや、DAアンタゴニストにはみられない性質をもったOPC-4392を利用することによってDA支配PRL分泌制御機構に対する新しい知見が得られるのではないかと考えた。さらに、仮に、報告されているように、OPC-4392が脳内のDAオートレセプターとシナプス後D2レセプターに対して全く逆の効果を示すという特異性を保有するならば、このことにより下垂体DAレセプターの性質をより詳しく検討することが

できると考えた。

以上の背景により、以下第1章では下垂体前葉細胞の単層培養において、PRL分泌に対するOPC-4392の影響をDAアゴニスト、アンタゴニストと比較しつつ検討を加え、さらに、DAアゴニスト、DAアンタゴニストとOPC-4392を共存させて下垂体細胞に作用させそれらの相互作用をも含めた結果より、OPC-4392の下垂体細胞のPRL分泌に対する直接効果と、下垂体DAレセプターの特性について検討した。

II 材料と方法

1. 動物

当教室で継代繁殖したウィスター・イマミチ系雄ラット（3～5カ月令）を用いた。動物は室温 $23 \pm 1^\circ\text{C}$ 、14時間明、10時間暗、（5時～19時点灯）の光条件下で飼育し、飼料（オリエンタル実験動物固形飼料MF）と水は自由に摂取させた。

2. 下垂体前葉細胞の浮遊化と培養

1) 下垂体前葉細胞の浮遊化

コラゲナーゼを主体とする方法（Shiota et al., 1984）で細胞の浮遊化を行った。細胞の浮遊化に用いたガラス器具は、細胞のガラス表面への付着を防ぐため全てSigmacoat（Sigma）によってシリコンコート処理したものをを用いた。動物を断頭後、クリーンベンチ内で頭部より下垂体前葉を取り出し、バッファーA [137 mM NaCl, 5 mM KCl, 0.7 mM Na_2HPO_4 , 25 mM HEPES（Sigma）, 50 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 硫酸ゲンタマイシン（Sigma）pH 7.3] の入った小ペトリ皿に保存した。必要数の下垂体（下垂体1個で約 2×10^6 個の細胞を得ることができる）を採取した後、下垂体を、約 1 mm^3 に細切し、バッファーAで洗浄し、以下の2段階の酵素処理を行った。バッファーAにコラゲナーゼ（Sigma, Type I）40 mg、BSA（Sigma, Essentially Fatty Acid Free A6003）40 mg、DNase（Sigma）100 μg 、グルコース 20 mgを加えた酵素液I（10 ml）に下垂体片

を入れ、おだやかに攪拌しながら37℃、1時間インキュベーションした。インキュベーション終了時に、ピペットで気泡を生じさせないように注意しながら、下垂体片の入った酵素液の吸入排出を繰り返し組織片を分散させたのち、室温で480×gで6分間遠沈した。上清を除去した後、下垂体細胞ペレットにバッファーAに10%Viokase (Gibco)を加えた酵素液II (10ml)を加え、ピペットで再懸濁させた後、おだやかに攪拌しながら37℃、8分間インキュベーションした。インキュベーション終了後、牛胎仔血清 (Gibco) 2mlを加えて酵素反応を止め、480×g、6分間遠沈した。上清を捨て下垂体細胞ペレットにメディウムI [Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM, Gibco)、10%牛胎仔血清 (Gibco)、3.7g/l NaHCO₃、20mM HEPES、50U/ml ペニシリン (萬有製薬)、50μg/ml ストレプトマイシン (明治製薬) pH7.3]を加えて懸濁し、5mlティスポーザブルシリンジの先を切断し、切断面にナイロンメッシュ (150×T2)を取り付けた濾過器で濾過後、遠沈、上清除去、メディウムIを加え懸濁する操作を2回繰り返し、最後に10mlのメディウムIに細胞を懸濁させ0.1mlを細胞数ならびに生存率の測定に用い、残りを培養に供した。

2) 細胞数および生存率の測定

Dye exclusion testによる細胞数ならびに生存率に測定を行なった。細胞浮遊液0.1mlに同量の0.2%トリパンブルー生理食塩水溶液を加え混合し、15分後に顕微鏡下で血球計算盤を用い、細胞質が染色されていないことをもって生存細胞と判定し、生存細胞数を算定した。生存率は90%以上であった。

3) 下垂体前葉細胞の培養

浮遊化した細胞は、 5×10^5 生細胞/mlとなるようにメディウムIで希

釈し、直径35mmのプラスチック製培養皿 (Falcon) に1mlずつ分注し、CO₂インキュベーターで、湿度100%、37℃、5%CO₂-95%airで培養した。培養開始後3日目で1mlのメディウムIで培養液の交換を行った。

以上の下垂体前葉細胞の浮遊化と培養方法をフローチャートとしてFig. 1-1に示した。

3. 静置培養

1) インキュベーションメディウムの調製

Dopamine-hydrochloride (ドパミン DA) (Sigma) は、1%アスコルビン酸を加えた生理食塩水に、プロモクリプテン (CB-154) (Sandoz) は、3%酒石酸に、7-[3-[4-(2,3-dimethylphenyl)piperadiny]propoxy]-2(1H)-quinolinone, (OPC-4392, 大塚製薬より供与)、ハロペリドール (Sigma) は、0.1M乳酸に、また3-(3-hydrophenyl)-N-n-propilpidine (3-ppp) (大塚製薬より供与)、アボモルフィン (Sigma)、は生理食塩水に $10^{-3} \sim 10^{-4} M$ の濃度で各々実験直前に溶解し stock-solution とした。OPC-4392についてはFig. 1-2に構造式を示した。これらの stock-solution を、20mM HEPES、NaHCO₃ 3.7g/lを加えたDMEM pH7.3 (メディウムII) で必要濃度に希釈し、インキュベーションメディウムとした。試薬の溶解に用いた有機酸のインキュベーションメディウム中の最終濃度は、アスコルビン酸0.01%、乳酸0.002%、酒石酸0.003%とした。

2) インキュベーション

細胞を4日間培養した。培養皿より培養液を取り除きメディウムII 2 mlを培養皿にいれ、培養皿を緩やかに水平に2~3回回転した後メディウムIIを取り除く作業を3回繰り返して培養皿に付着した細胞を洗浄した。インキュベーションメディウム1 mlを培養皿に入れ、37°C、5% CO₂-95% airで3時間インキュベーションした。インキュベーション後のメディウムはBSAでコートした試験管に回収し、インキュベーション中にわずかに剝離してくる細胞を除去するため480×gで遠沈し、上清をホルモン測定時まで-20°Cで凍結保存した。

4. PRLの測定

PRLのラジオイムノアッセイの概要をFig. 1-3に示した。標識ホルモンには、ラクトパーオキシダーゼ法によりヨード化させたNIADDK-rPRL-1-5を、標準ホルモンとしてNIADDK-rPRL-RP-3を用い、測定ごとに毎回スタンダードカーブを作製した。

5. 統計

平均値の差の検定は、Student's t testによって行い危険率5%以内をもって有意水準とした。

III. 結果

1. 下垂体培養細胞のPRL分泌に対するOPC-4392の影響

下垂体のPRL分泌に対するOPC-4392の直接効果をDA、およびDAアゴニストであるCB-154、3-pppと比較しつつ検討した(Fig. 1-4)。

その結果、CB-154は、 10^{-10} Mの濃度でPRL分泌を基礎分泌(薬剤無添加)の $84.7 \pm 3.0\%$ 、 10^{-9} Mで $33.3 \pm 1.5\%$ 、 10^{-8} Mで $19.5 \pm 1.9\%$ まで減少させた。3-ppp、DAも 10^{-9} Mより用量依存的にPRL分泌を抑制し、 10^{-6} Mの3-pppおよびDAでそれぞれ $13.1 \pm 4.4\%$ 、 $9.8 \pm 1.4\%$ までPRL分泌は減少した。OPC-4392は、PRL分泌を 10^{-8} Mの濃度で基礎分泌の $50.9 \pm 3.9\%$ に減少させ、 10^{-7} Mで $23.8 \pm 1.0\%$ まで減少させた。したがって、OPC-4392は、他のDAアゴニストと同様に下垂体に対して用量依存的にPRL分泌を抑制する作用のあることが示された。またこれらの薬剤のPRL分泌抑制に対する半最大有効濃度(EC50)は、おおよそCB-154で 2×10^{-10} M、3-pppで 3×10^{-9} M、DAで 8×10^{-9} M、OPC-4392で 6×10^{-9} Mであった。

2. ハロペリドールの下垂体培養細胞のPRL分泌に対する影響

ハロペリドールを下垂体培養細胞に作用させた結果(Fig. 1-5)、 10^{-8} Mから 10^{-6} Mの濃度ではPRL分泌に対しては影響を与えなかったが、

10^{-5} Mにおいて基礎分泌（ハロペリドール無添加）に比べて有意にPRL分泌を抑制した（ $2207.1 \pm 87.4 \text{ ng/ml}$ vs $769.2 \pm 49.2 \text{ ng/ml}$ ）。DAレセプターブロッカーとされるハロペリドールにおいても下垂体PRL分泌に対して高濃度では抑制作用が認められることが示された。

3. OPC-4392のPRL分泌抑制に対するハロペリドールの効果

OPC-4392と前節に示されたPRL分泌に影響を与えない濃度（ $10^{-9} \sim 10^{-6}$ M）のハロペリドールを共存させて、下垂体培養細胞に作用させOPC-4392のPRL分泌抑制がDAアンタゴニストのハロペリドールによって阻害されるか否かを検討した（Fig. 1-6）。

その結果、 $10^{-9} \sim 10^{-6}$ Mのハロペリドールとの共存によって、PRL分泌抑制曲線はハロペリドールの用量が増加するにつれて右上方にシフトし、OPC-4392によるPRL分泌抑制効果をハロペリドールが阻害することが示された。

4. DA、アポモルフィンのPRL分泌抑制に対するOPC-4392の効果

DA自体あるいは、DAアゴニストのアポモルフィンとOPC-4392を共存させて下垂体培養細胞に作用させ、PRL分泌抑制効果に対する影響を調べ、OPC-4392がDAアンタゴニスト作用を発現するか否かを検討した（Fig. 1-7）。

その結果、DA 10^{-7} MによるPRL分泌の抑制は、OPC-4392 10^{-10} M $\sim$ 10^{-9} Mの共存によっては、影響を受けなかった。しかしながら、

OPC-4392 それ自身が PRL 分泌を抑制する濃度である $3 \times 10^{-9} M$ 、 $10^{-8} M$ と DA $10^{-7} M$ と共存させると、PRL 分泌は各々、 $359.2 \pm 26.9 \text{ ng/ml}$ 、 $357.2 \pm 20.4 \text{ ng/ml}$ と DA $10^{-7} M$ 単独での PRL 分泌量 ($237.2 \pm 20.6 \text{ ng/ml}$) に比べ有意に高い値を示した (Fig. 1-7)。一方、アポモルフィン $10^{-8} M$ で抑制された PRL 分泌は $10^{-10} \sim 10^{-8} M$ の OPC-4392 の共存によっては変化をひき起こさなかった (Fig. 1-8)。

IV. 考察

D A レセプターは、行動、神経化学的に、あるいは単一神経細胞からの電気的反応によって分析されてきたが、現在はその局在、機能等により D A ニューロンに存在し、D A ニューロンの活動に対して、抑制的に作用する自己レセプター（オートレセプター）と、D A ニューロンのシナプス後ニューロンに存在し、D A を受容するシナプス後レセプターに分類される (Roth, 1979)。また、細胞内 2 次メッセンジャー系の共役の仕方と薬理学的な性質という観点に立って、アデニレートサイクラーゼ活性に対して、促進的に共役するレセプターを D 1 レセプター、共役しないかむしろ抑制的に共役するレセプターを、D 2 レセプターとして分類することもある (Kebabian and Calne, 1979)。オートレセプターは D 2 レセプターに属するとされ、シナプス後レセプターは、D 1 と D 2 レセプター両者が存在する (Stoof and Kebabian, 1984)。下垂体細胞 (P R L 分泌細胞、あるいは少なくとも P R L 分泌細胞が含まれる集団と考えられる) の、基礎レベル (Enjalbert and Bokaert, 1982)、及び Vasoactive intestinal polypeptide (V I P) (Onalli et al., 1981) で刺激したアデニレートサイクラーゼ活性は D A によって抑制されることが知られており、これらのことから、下垂体 D A レセプターは D 2 レセプター分類され、P R L 分泌は、アデニレートサイクラーゼ活性を抑制することによって抑制されるのではないかと考えられている (Barnes et al., 1978; Swennen and Deneef, 1982)。一方、O P C-4392 は、オートレセプターにはアゴニストとして、シナプス後 D 2 レセプターにはアンタゴニストとして働くとされており、下垂体 D A レセプターは、T I D A ニューロンのいわば「後」に存在するので、シナプス後 D 2 レセプターの性質を持つことも予想される。従って、もしそうであれば

OPC-4392は下垂体にはアンタゴニストに作用し、それ自身では、*in vitro*下垂体細胞のPRL分泌に影響を与えないことが予想された。

しかしながら、OPC-4392は、下垂体細胞のPRL分泌に対して、DAアゴニストであるCB-154よりは弱いもののDAと同じオーダーの抑制曲線を示し、PRL分泌を用量依存的に強く抑制した(Fig. 1-4)。また、PRL分泌に影響を与えない濃度のDAアンタゴニストであるハロペリドールを共存させると、OPC-4392のPRL分泌抑制効果は明らかに阻害を受け(Fig. 1-6)、OPC-4392は下垂体DAレセプターに対してアゴニスティックに作用しているものと考えられた。但し、典型的なDAアンタゴニストであるハロペリドール(Andén et al., 1966)も高濃度においてはPRL分泌を抑制することが認められ(Fig. 1-5)、これは、下垂体DAレセプターを介した作用であると考えられた。このことは後で議論する。

また、DAアゴニストのアボモルフィン 10^{-8} Mの下垂体PRL分泌抑制に対しては、OPC-4392は、たとえ高濃度を負荷したとしても全く影響を与えなかった(Fig. 1-8)。つまり、アボモルフィンのアゴニスト作用が発現しているような条件では、OPC-4392は、何等の効果を発現しないことから、OPC-4392は単独ではアゴニスティックに作用していることが示唆された。以上のことより、予期に反し、OPC-4392は下垂体DAレセプターに対してはアンタゴニスト作用を示さないことが明かとなった。

ハロペリドールは、DAアンタゴニストであり、D1レセプターよりD2レセプターに親和性が高い(寺井ら, 1984)薬剤である。ハロペリドールにより、*in vitro*でDAあるいは、DAアゴニストによるPRL分泌抑制が阻止されることが知られており(MacLeod, 1976)、また*in vivo*においてもハロペリドールの投与によって血中PRL濃度が上昇することが知られている(Dickerman et al., 1972)、さらに、放射性リガンドを用いた研究によってハロペリドールが下

垂体に対して特異的な結合部位を持つことが示され、結合したハロペリドールは他のDAリガンドにより競合的に排除されることも示されている (Calabro and MacLeod, 1978)。これらのことより、ハロペリドールによるDAおよびDAアゴニストのPRL分泌抑制の阻止作用は、ハロペリドールの下垂体DAレセプターへの結合によってDA、DAアゴニストのレセプターへの結合が阻害されることによって起こると考えられる。ハロペリドールは、濃度依存的にOPC-4392の下垂体細胞のPRL分泌抑制曲線を右にシフトさせる傾向を示した (Fig. 1-6)。このことは、OPC-4392がDAレセプターに結合するのをハロペリドールが競合的に阻害した結果であることを強く示唆する。

オートレセプターアゴニストといわれている3-ppp (Hjorth et al., 1981) を用いて培養下垂体細胞のPRL分泌を調べたところ、用量依存的にこれを抑制した (Fig. 1-4)。

このことと、OPC-4392がオートレセプターアゴニスト-シナプス後D2レセプターアンタゴニストとしての薬理学的特性が示唆されていること (Yasuda et al., 1988) と考え併せると、下垂体PRL分泌細胞膜上に存在するDAレセプターは、DAニューロンの「後」部位にあるのにもかかわらず脳内に存在するシナプス後D2レセプターよりは、むしろ、オートレセプターと共通した特性を持つことが強く示唆された。オートレセプターは、シナプス前膜以外にも、神経細胞体、樹状突起などのDA放出部位から離れたところにも存在するとされ (Roth, 1979)、比較的低濃度のDAに反応することが要求される。下垂体DAレセプターも正中隆起外層のDA分泌神経終末よりはるかに離れた位置に存在する。従って下垂体DAレセプターは、シナプス構造内に存在するシナプス後DAレセプターに比べれば、相対的に低い濃度のDAで反応しなければならない。DAアゴニストであるアポモルフィン、電気生理学的

(Skirboll et al., 1979)、行動学的 (Strömbom, 1975) および神経化学的に低濃度においてオートレセプターに対しアゴニストの作用を示し高濃度でシナプス後 DA レセプターアゴニストの作用を示すといわれている (Goodale et al., 1980)。少なくとも、下垂体門脈血に存在する程度の濃度によってドパミン性の調節を行なうためには、その親和性からいって、下垂体の DA レセプターがオートレセプター類似のものであることは合目的であろう。

ハロペリドールの濃度を上げたときに PRL 分泌が抑制されること (Fig. 1-4)、DA の PRL 抑制効果が高濃度の OPC-4392 でわずかではあるが、阻害されること (Fig. 1-7)、しかし、アポモルフィンのそれは阻害されないこと (Fig. 1-8) は、下垂体 DA レセプターの性質を間接的に表現している結果と考えられる。DA レセプターが、複数存在するとするののも一つの考えではあるが、むしろ将来このレセプターの性質、あるいは物質としての解析が進展すればかりにレセプター分子が一種類であっても、合理的に理解され得る現象なのかも知れない。

以上により、OPC-4392 は、下垂体 PRL 分泌にたいして殆ど DA アンタゴニスト作用を示さず、下垂体 PRL 分泌を強く抑制すること、さらに DA アンタゴニストハロペリドールによってその抑制が拮抗されることより、下垂体 DA レセプターに対してアゴニストとして作用することが示され、下垂体 DA レセプターはオートレセプターの特性を持つものと推定された。

また、OPC-4392 は、脳内 DA 活性に対しては抑制的に、下垂体 DA 活性に対しては促進的に働くことになり、従来の DA アゴニストやアンタゴニストとは異なる新しいタイプの化合物であることが明かとなり、PRL 分泌機序における、DA 系支配を解析する手段として非常に有用であることが示唆された。そこで、第 2 章において、superfusion (細胞表面灌流) 系をもちいて OPC-4392 の PRL 分泌に対する動的な解析を加え、その特性についてさ

らに検討を加える。

第 1 章 图表

Procedure for dissociation of pituitaries

anterior pituitaries

- wash with buffer A

cut into 1mm^3 pieces

- wash twice with buffer A
- add 10ml of enzyme solution I

incubation with shaking at 37°C for 60min

centrifuge at $480\times g$ for 6min

- discard supernatant
- add 10ml of enzyme solution II

incubation with shaking at 37°C for 8min

- add 2ml of fetal calf serum

centrifuge at $480\times g$ for 6min

- discard supernatant

suspend sedimented cells with 10ml of medium I

- wash cells twice with medium I
- cell count

dilute to 5×10^5 cell/ml in medium I

and distribute into culture dishes

Fig. 1-1

下垂体前葉細胞の浮遊化のフローチャート

Fig. 1-2

OPC-4392の化学構造式

Radioimmunoassay for rat PRL

100 μ l sample or standard hormone

 | Add 500 μ l assay buffer¹

 | 200 μ l anti-ratPRL solution²

Incubation for 24h at 4°C

 | Add 100 μ l 125I-labeledPRL solution³

Incubation for 48h at 4°C

 | Add 200 μ l anti- γ -globulin solution⁴

Incubation for 48h at 4°C

Centrifuge at 1300 $\times$ g for 20min at 4°C

Count radioactivity of precipitate by Auto γ Spectrometer

- 1) 0.01M phosphate buffered saline (PBS) containing 0.1%Na₂S₂O₅ and 1%BSA
- 2) anti-ratPRL solution containing 50mM EDTA and 1%normal rabbit serum
- 3) 125I-ratPRL 10000 cpm/0.1ml of assay buffer
- 4) anti-[rabbit γ -globulin] goat serum diluted 1:30 with PBS

Fig. 1-3

PRLラジオイムノアッセイのフローチャート

Fig. 1-4

OPC-4392、3-ppp、CB-154、DAの下垂体単層培養細胞のPRL分泌に対する効果

■ OPC-4392 □ 3-ppp ● CB-154 ○ DA

値は、コントロール(Basal Release)のPRL分泌に対する%で表わした。各点および縦線は平均値±標準誤差を示す。縦線を欠くものは点内に標準誤差が含まれる。

Fig. 1-5

ハロペリドールの下垂体単層培養細胞のPRL分泌に対する効果

各点および縦線は平均値±標準誤差を示す。縦線を欠くものは点内に標準誤差が含まれる。

Fig. 1-6

OPC-4392によって抑制された下垂体単層培養細胞のPRL分泌に対するハロペリドールの効果

値は、コントロール(Basal Release)のPRL分泌に対する%で表わした。各点および縦線は平均値±標準誤差を示す。縦線を欠くものは点内に標準誤差が含まれる。

Fig. 1-7

DA 10^{-7} M によって抑制された下垂体単層培養細胞の PRL 分泌に対する OPC-4392 の効果

○ OPC-4392 単独、● OPC-4392 + DA 10^{-7} M

各点および縦線は平均値 ± 標準誤差を示す。縦線を欠くものは点内に標準誤差が含まれる。* は $p < 0.05$ で DA 10^{-7} M のみと DA 10^{-7} M + OPC-4392 負荷群との間で有意差のあることを示す。

Fig. 1-8

アモルフィン 10^{-8} M によって抑制された下垂体単層培養細胞の PRL 分泌に対する OPC-4392 の効果

○ OPC-4392 単独、● OPC-4392 + アモルフィン 10^{-8} M
 各点および縦線は平均値 ± 標準誤差を示す。縦線を欠くものは点内に標準誤差が含まれる。

第2章 Superfusionを用いたOPC-4392の
PRL分泌動態に対する検討

1. はじめに

ラットではストレス負荷 (Ajika et al 1972)、吸乳刺激 (Grosvenor and witworth, 1974) によって PRL が分泌されるのに加えて、発情前期ゴナドトロフィンサージに随伴する PRL サージ (Butcher et al., 1974)、妊娠前半または偽妊娠での 1 日 2 回の PRL サージ (Butcher et al., 1972; Freeman et al., 1974) 等の生理的 PRL 分泌相の存在が知られている。PRL 分泌は、常態では、TIDA ニューロン神経終末より門脈へ分泌される DA による抑制支配下にある (Ben-Jonathan, 1985)。卵巣除去偽妊娠ラットの PRL サージに同期して、門脈血中 DA 濃度が減少することが報告されており (DeGreef and Neill, 1979)、PRL 分泌は、この DA の抑制がはずれて起こることが強く示唆されている。

一方、視床下部抽出物が、*in vivo* で PRL 分泌を上昇させることが報告された (Boyd et al., 1976)。現在までに、Thyrotropin-releasing hormone (TRH)、Vasoactive intestinal polypeptide (VIP)、ニューロテンシン、アンギオテンシン II (McCann, 1982)、Peptide histidine isoleucine (PHI) (Shimatsu et al., 1983) などの神経ペプチドが、*in vivo*、*in vitro* で PRL 分泌を上昇させることが報告されている。吸乳刺激時に TRH 抗血清を投与したり (DeGreef et al., 1987)、吸乳刺激、エーテルストレス時に VIP 抗血清を投与すると (Abe et al 1985)、これらの刺激にともなう血中 PRL 濃度の上昇が部分的に抑制されること、また、門脈中の DA 濃度の変化のみでは PRL 分泌動態を完全には説明できないこと (Gibbs and Neill, 1978) などから PRL 放出促進因子 (prolactin releasing factor PRF) の存在が想定されている。

生体内における PRL 分泌に対する制御は、PIF (DA) あるいは PRF

一方のみの減衰、増加といった単純なものではなく、両者の動的相反支配によって制御されているものと考えられる。

このような動的な現象を *in vitro* で検討しようとするとき、静置培養で行なうことは必ずしも適当ではない。Superfusion法は、内分泌組織片または、細胞をカラム内に収容し、メディアムで連続的に灌流することによりそれらの分泌動態を観察する方法であって、組織、細胞より分泌された物質が蓄積することが少なくいわゆるプロダクトインヒビションによる影響を排除できること、経時的、連続的、可逆的、多元的（2種類以上の物質を作用させその反応を解析することが可能である）に、*in vitro* の長所である生体内の複雑な因果応答連鎖を排した条件で検討できる等、ホルモン分泌動態を探る上できわめて優れた方法である。副腎（Lowry and McMartin, 1974）、下垂体（Lowry, 1974; Smith and Vale, 1980; Shiota et al., 1984）、黄体細胞（Murakami et al., 1982）、顆粒層細胞（kadota et al., 1988）等多くの内分泌組織あるいは、細胞において分泌刺激ホルモン、分泌抑制ホルモン、細胞内2次メッセンジャー等の負荷による *superfusion* による解析がなされそれらのホルモン分泌機序の解明に大きく貢献してきた。そこで著者は、*superfusion*法を用いることによって、視床下部から放出される P I F（DA）と P R F の二重支配の再現を試みつつ、生理的に近い条件で O P C - 4 3 9 2 の P R L 分泌に与える影響をさらに詳しく検討することにした。

下垂体 *superfusion*法には、下垂体片を用いる方法と培養細胞を用いる方法がある。下垂体片を用いる方法は比較的簡便ではあるが、採取した時点での個体間の反応性の差を反映してしまう可能性があること、短時間の間欠的な作用において作用物質が組織内部まで速やかに拡散するかどうかなどの点に問題をはらむ等の難点を持つ。これに対し、Smith と Vale（1980）によって始められた、遊離化させた細胞を、マイクロキャリアに付着させたものを用いる方法では、

細胞表面を灌流液がくまなく流れることが可能となること、細胞をあらかじめ数日間培養してから用いることができるために条件を一定にそろえやすいこと等の長所を持つので、著者は本法を用いて実験を行なった。

本章では、生理的 P I F とされる D A、代表的 D A アゴニストである C B - 1 5 4、そして O P C - 4 3 9 2 を superfusion 系に作用させ、それぞれの P R L 分泌に与える影響を検討し、さらに、生理的 P R F の一つとされる T R H とこれらの D A、D A アゴニストを同時に灌流し、下垂体 P R L 分泌動態の解析、ならびに O P C - 4 3 9 2 の P R L 分泌に対する作用の特異性について検討した。

II. 材料と方法

1. マイクロキャリアの調整

マイクロキャリアには、Cytodex-1 (Pharmacia) を用いた。Cytodex-1 にバッファーA [137 mM NaCl, 5 mM KCl, 0.7 mM Na_2HPO_4 , 25 mM HEPES, 50 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 硫酸ゲンタマイシン pH 7.3] を加え25 ml にメスアップし、115°C、15分のオートクレーブ処理によって、膨潤および滅菌を行なった。

2. 細胞の浮遊化とマイクロキャリアへの付着

動物は、3~4ヶ月令のウイスター系ラットを用い、第1章と同一の方法で下垂体を採取、酵素的に細胞を浮遊化、細胞数を算定した。細胞浮遊液は、メディウムI [DMEM, 10%牛胎仔血清, 3.7 g/l NaHCO_3 , 20 mM HEPES, 50 $\mu\text{g}/\text{ml}$ ストレプトマイシン, 50 U/ml ペニシリン pH 7.3] で 3×10^5 生存細胞に希釈した。細胞浮遊液100 ml に対し、2.5 ml の割合で、膨潤させたCytodex-1懸濁液を加え、Cytodex-1が均等に浮遊するように攪拌しながら、直径9 cmのガラス製ペトリ皿に15 ml ずつ駒込ピペットで分注した。細胞は、 CO_2 インキュベーターで37°C、5% CO_2 -95% air、湿度100%で培養し、Cytodex-1に付着させ、4日間培養後、実験に供した。

3. 灌流液の調製

灌流液は、20 mM HEPES、0.93 g/l NaHCO_3 を加えたDMEM (メディウムⅢ)をベースとした。OPC-4392は、0.1 M 乳酸に、CB-154は、3% 酒石酸に、DAは、アスコルビン酸を加えた生理食塩水に、TRH (武田薬品)は0.1% BSAを加えた生理食塩水に、各々 10^{-2} ~ 10^{-8} Mの濃度で実験直前に溶解した。溶解した試薬は、メディウムⅢで必要濃度(DA 10^{-5} 、 10^{-7} 、 10^{-8} M、OPC-4392 10^{-5} M、CB-154 10^{-5} M、TRH 10^{-7} M)に希釈した。試薬の溶解に用いた有機酸がホルモン分泌に影響する可能性を考慮し、試薬を作用させないときに用いる灌流液にも、試薬のはいった灌流液と同じ濃度の有機酸を加えた。

4. Superfusion

Superfusionは、Shiotaら(1984)の方法に準じて行い、その模式図を(Fig. 2-1)に示した。

灌流液の流路は、ペリスタリティックポンプ部分には、内径1.3 mmのシリコンチューブを、他は内径1.14 mmおよび0.76 mmのポリエチレンチューブを用い、灌流前に0.1% BSA溶液でコートした。灌流液は、灌流前に5% CO_2 -95% O_2 を飽和させた。

上部ロート部分を取り外した、エコノカラム(0.7×4 cm Biorad)にCytodex-1に付着した細胞をカラム内に気泡が入らないように注意しながら、カラムの下端から1 cmの高さまで詰め細胞カラムとした。細胞カラムは2本用意し、同時に2本のsuperfusionが行えるようにした。カラムの下端は、フラクションコレクターへの流路(ポリエチレンチューブ)に注射針によって接続

した。細胞カラムの上部にはゴム製の蓋をし、灌流液瓶、ペリスタリティックポンプ、小室（メディウムより発生する気泡除去用）の順に接続したチューブに取り付けた注射針を貫通させた。最後に細胞カラムを37℃のウォーターバス内に据え付けた金属製の網に垂直に固定し流路を完成させた。

流速0.25 ml / 分でsuperfusionを開始した。細胞の灌流系への適応とホルモン分泌の安定化を図るため、60分間前灌流を行なった後、以下の実験を行なった。

- 1) DA 10^{-8} M, 10^{-7} Mを30分間づつ連続して灌流した。
 - 2) OPC-4392 10^{-5} Mを60分間灌流した。
 - 3) DA 10^{-5} Mを60分間灌流した。
 - 4) CB-154 10^{-5} Mを60分間灌流した。
 - 5) TRH 10^{-7} Mを10分間灌流した後、150分の間隔をあけて再び、
TRH 10^{-7} Mを10分間灌流した。
 - 6) DA 10^{-5} Mを100分間灌流しDA灌流中に〔5〕の1回目のTRH作用時間と同時刻〕にTRH 10^{-7} Mを10分間灌流した。DA灌流終了後60分の間隔をあけてOPC-4392 10^{-5} Mを100分間灌流し、OPC-4392灌流中に〔5〕の2回目のTRHの作用時間と同時刻〕にTRH 10^{-7} Mを10分間灌流した。
 - 7) OPC-4392 10^{-5} Mを100分間灌流しOPC-4392灌流中に〔5〕の1回目のTRH作用時間と同時刻〕にTRH 10^{-7} Mを10分間灌流し、OPC-4392灌流終了後60分の間隔をあけてCB-154 10^{-5} Mを100分間灌流し、CB-154灌流中に〔5〕の2回目のTRHの作用時間と同時刻〕にTRH 10^{-7} Mを10分間灌流した。
- 灌流培養液は、フラクションコレクターで、1)の実験では、10分毎、他

の実験では、5分毎にBSAでコートした試験管内に回収した。採取した灌流培養液はホルモン測定時まで-20℃で凍結保存した。

5. PRLの測定

灌流液中のPRLは、第1章と同一の方法でラジオイムノアッセイによって測定した。

III. 結果

1. Superfusion法による下垂体培養細胞のPRL分泌に及ぼすOPC-4392、DA、CB-154の効果

1) 予備的検討

Superfusion系に $10^{-8}M$ 、 $10^{-7}M$ のDAを作用させ、10分ごとに灌流液を採取した(Fig. 2-2)。

DA $10^{-8}M$ の30分の灌流によってPRL分泌はDA作用前の約70%に減少し、引き続き30分の $10^{-7}M$ のDAの灌流によってPRL分泌は基礎分泌の約50%まで減少した。DAの灌流が終了した時点で、PRL分泌は速やかにほぼ基礎分泌(DA灌流前のPRL分泌)のレベルに戻った。したがって、superfusion系においてもDAによってPRL分泌が、用量依存的に抑制され、PRL分泌の解析に有用なことが示された。

しかしながら、静置培養(1章)ではPRL分泌がDA $10^{-7}M$ で基礎分泌の約10%(Fig. 1-3)まで減少したのに対しsuperfusion法では前述の如く、約50%の減少にとどまり、PRL分泌抑制に対する反応は静置培養に比べやや劣る傾向がみられた。したがって、以降のsuperfusion法の実験においてはDA、CB-154、OPC-4392は、 $10^{-5}M$ の濃度で作用させた。また分泌動態をより詳しく検討するため、灌流液は5分ごとに採取した。

2) OPC-4392 $10^{-5}M$ のPRL分泌に対する影響

OPC-4392灌流開始直後は、PRL分泌に変化は見られなかったが25~35分にかけて一時的にPRL分泌は低下した。その後PRL分泌は基礎分泌のレベルまで戻り、OPC-4392灌流終了後も大きな変化は認めら

れなかった (Fig. 2-3)。

3) DA $10^{-5}M$ の PRL 分泌に対する影響

DA の灌流開始後やや変動がみられるものの PRL 分泌は著しく低下した。この PRL 分泌の低下は、DA 灌流終了後 35 分まで続き、その後基礎分泌のレベルまで PRL 分泌が回復した (Fig. 2-4)。

4) CB-154 $10^{-5}M$ の PRL 分泌に対する影響

CB-154 の灌流によって PRL 分泌は急激に減少し、CB-154 の灌流中は、基礎分泌の約 10% まで低下した。さらに CB-154 灌流終了後においても PRL 分泌は、少なくとも、2 時間 30 分にわたって、抑制されたままであった (Fig. 2-5)。

2. OPC-4392、DA、CB-154 の TRH による PRL 分泌刺激に対する影響

TRH ($10^{-7}M$) を 10 分間 2 回にわたって灌流すると PRL 分泌は、一過的に上昇しそのピークは、TRH 作用前 ($40 \sim 60 ng/ml$) の 4~5 倍の値 (1 回目、 $228 ng/ml$ 、2 回目、 $254 ng/ml$) を示し、TRH 灌流終了後 20 分には、ほぼ基礎分泌の値に戻った (Fig. 2-6)。

TRH ($10^{-7}M$) を 10 分間、1 回目には DA ($10^{-5}M$) 灌流中に、2 回目には OPC-4392 ($10^{-5}M$) の灌流中にそれぞれ灌流した結果を Fig 2-7 に示した。DA によって PRL 分泌は基礎分泌 ($45 \sim 65 ng/ml$) に比べ $10 ng/ml$ 前後と著しく減少し、TRH を灌流すると、そ

れに対応したPRL分泌の上昇が観察されたが、TRHのみの灌流(Fig. 2-6)に比べそのピークは極めて小さく(43 ng/ml)、TRHによるPRL分泌刺激はDAによって強く抑制された。しかしながら、DAの灌流を終了させたあとに、DA単独投与終了後には認められなかったPRL分泌の大きな上昇(150~230 ng/ml)が観察された。OPC-4392 ($10^{-5}M$)の灌流に伴って、PRL分泌は60~70 ng/mlまで減少した。この状態でTRHを負荷することによってPRL分泌は大きく上昇しそのピークは340 ng/mlに達し、TRHによるPRL分泌刺激に対するOPC-4392の抑制効果は認められなかった。OPC-4392灌流終了時には、DA灌流終了時に見られたPRL分泌の上昇も認められなかった。

次に、TRH ($10^{-7}M$)を10分間づつ、1回目にはOPC-4392 ($10^{-5}M$)灌流中に、2回目にはCB-154 ($10^{-7}M$)灌流中にそれぞれ流した結果をFig. 2-7に示した。OPC-4392の灌流によっては、基礎分泌に比べPRL分泌の減少は認められず、この状態でTRHを負荷するとPRL分泌上昇のピークは、TRHのみの灌流(Fig. 2-6)に比べ絶対値ではやや小さいものの(175 ng/ml)、基礎分泌(35~40 ng/ml)に対する比率では4倍以上に達し、TRHのPRL分泌刺激作用に対してのOPC-4392による抑制効果はほとんど認められなかった。OPC-4392灌流終了後のPRL分泌は基礎分泌、およびTRH作用前のOPC-4392灌流時とほぼ同じレベルであった。CB-154の灌流によってPRL分泌は低下し、この状態でTRHを灌流すると、PRLの上昇が認められたが、そのピークは、74 ng/mlとTRH単独の灌流(Fig. 2-6)に比べ著しく小さく、CB-154によってTRH分泌刺激は強く抑制された。その後のCB-154灌流終了時には、PRL分泌は変化せずDA+TRHの場合と異なりPRL分泌の著しい増加は観察されなかった。

IV. 考察

生体内においては正常な状態ではPRL分泌は視床下部の強い影響を受けており、OPC-4392を生体内に投与しPRL分泌に対する影響は、下垂体に対するものと内生的なPIF(DA)やPRFに対する影響を考慮せねばならない。そこで本章ではsuperfusion系によって、視床下部の他の因子の影響や、2次的な影響を排除しつつ、PRFとしてTRHを用い、生理的PIFとしてDAを、DAアゴニストCB-154とともにOPC-4392の下垂体PRL分泌に対する影響を検討した。

DAのPRL分泌抑制効果は静置培養に比べやや弱く表現される傾向がみられた(Fig. 2-2)。この原因は、不明であるが、DAのPRL分泌抑制作用の一つとして、DAがPRLに対するプロダクトインヒビション作用を増強させる効果を持つと仮定すれば、静置培養と異なり灌流液によって分泌されたPRLが速やかに細胞周囲より取り除かれるため、この効果の分が差し引かれているためと説明することができるかも知れない。

DAはPRL分泌を速やかに抑制し、DAの作用から開放されてから比較的速やかにPRL分泌に対する抑制が解除された(Fig. 2-4)。また、TRHを負荷するとPRL分泌は促進された(Fig. 2-6)。DAの持続的負荷条件下でTRHを作用させても、そのPRL分泌刺激効果は、強く抑制されるが、DA負荷を終了させた時点で、TRHの影響によると思われるDA単独作用の終了時では観察されなかった著しいPRL分泌の昇進がおこった

(Fig. 2-7)。このPRL分泌の増加は、TRHのみの刺激(Fig. 2-6)に比べてもはるかに大きなものであった。このことよりDAがPRL分泌を抑制している間に、合成から分泌にいたる過程の何れかに、PRLが蓄

積することが考えられた。したがってDAの減少によってPRL分泌がそれ以前の状態に復帰するだけでなく、その時点でPRFが存在すれば、PRFのPRL分泌刺激効果は誇張されて表現される可能性が示唆され、例えば生理的なPRLの大量分泌相においてもこのようなメカニズムが存在するのではないかと考えられた。

CB-154はPRL分泌を抑制したがDA (Fig. 2-4)と異なりCB-154の灌流終了後もPRL分泌は長時間にわたって抑制されたままであった (Fig. 2-5)。また、TRHのPRL分泌刺激効果に対して強い抑制効果を示し、さらに、CB-154作用終了後においてもDAで観察されたPRL分泌の昂進がみられなかった (Fig. 2-8)。これは、CB-154の下垂体レベルにおけるPRL分泌抑制作用が、長期間持続することも原因の一つと考えられる。すなわち、CB-154は、生体においてPRL分泌を長時間にわたって抑制することが知られている (Flückiger and DelPozo, 1978)が、これは、CB-154の血中の半減期が長いことに加えて (Bhuta, 1976)、DAレセプターに対してCB-154は親和性がDAに比べ高く (Caron et al 1977)、レセプターから離れにくいことが原因になっていると思われる。さらに、CB-154がDA (Rosenzweig and Kanwer, 1982)と同様に細胞内にインターナリゼーションし細胞内で、PRL分泌過程を抑制することが考えられるが、このような場合にもDAのような生体物質と異なり分解や排出が遅れることによって、効果が長く持続するかも知れない。前述の如くTRHのPRL分泌刺激をCB-154は強く抑制しCB-154灌流終了後にもDA (Fig. 2-7)と異なり、TRHによるPRL分泌の増大が全く見られない (Fig. 2-8)が、このことから生体内におけるCB-154によるPRL分泌の阻害効果は、単に下垂体門脈中のDAの増加を再現した結果のみと解釈するよりも、PRFによる分泌刺激効果をも阻害した結果と解釈

する方が妥当であろう。

OPC-4392は、PRLの基礎分泌に対しての抑制は、他の2つ(DAとCB-154)に比べて明らかに弱かった(Fig. 2-3)。しかし第1章での静置培養においては、OPC-4392は、強くPRL分泌を抑制し、抑制曲線もDAとほぼ重なっていたこと(Fig. 1-4)や、super-fusion系でもTRH投与でDA負荷を中止したときに見られるPRL分泌昂進を明らかに抑制する(Fig. 2-7)とみられることからsuperfusion系においてもOPC-4392は、PRL分泌抑制効果があるものと判断される。ところが、OPC-4392は、DA、CB-154と異なりTRHのPRL分泌刺激を殆ど抑制しなかった(Fig. 2-7、Fig. 2-8)。第1章の静置培養においてOPC-4392のPRL分泌に対する最大抑制はDAに比べると小さく(Fig. 1-4)また、わずかではあるが、DAのPRL分泌抑制がOPC-4392によって阻害されることも観察されたこと(Fig. 1-7)も考え併せると、OPC-4392は、下垂体DAレセプターに対して、パーシャルアゴニストとして作用することも考えられる。また、TRHが存在しているときにOPC-4392がDAアゴニストとして作用し難いとすれば、それは、TRHの効果の一部にDAレセプター作用に対するものが含まれているためと考えられるが、この点についてこれ以上考察を進めるような材料は見あたらない。何れにせよOPC-4392のTRHに対しての反応性がDA、CB-154と異なることはTRHのPRL分泌作用の発現メカニズムの解析という点でも、今後の興味ある課題の1つである。

DA、CB-154、OPC-4392の3者のsuperfusion系におけるPRL分泌にたいする影響は、量的のみならず質的にも非常に異なると解釈される結果を示した。すなわちCB-154は、PRLの基礎分泌のみならずTRH刺激分泌をDAと異なり長時間抑制するのに対し、OPC-4392は、

DAアゴニストでありながらTRHの様な生理的PRLセクレタゴーク(すなわちPRF)によるPRL分泌に対してはほとんど抑制効果を示さないという新しい特性を見いだすことができた。これらの性質を利用することによって、生理的なPRL分泌がDAの減少によるものかまたはPRFの増加によるものなのか、その両者であるのかという問題を解決する手段となり得ることが示唆され、第1章で得られた、脳内DA作用と下垂体DA作用に対する特異性と併せて、OPC-4392が生体におけるPRL分泌機序を探る手段として有用な薬剤であることが示唆された。

第3章では、数種の実験的PRL分泌モデル動物を作出し生体内におけるOPC-4392のPRL分泌に対するDAアゴニスト作用を確認し、生体内におけるPRL分泌機序に対しての検討を加えた。

第 2 章 图表

Fig. 2-1

Superfusion 系の模式図

Fig. 2-2

Superfusion系におけるDA 10^{-8} 、 10^{-7} Mの下垂体培養細胞PRL分泌に対する効果

灌流液は10分毎に採取した。□はDAを作用させた時間を表わす。

細線は各フラクションの値を、太線は灌流液のみ、またはDA負荷時の平均値を表わす

OPC-4392

Fig. 2-3

Superfusion系におけるOPC-4392 10^{-5} Mの下垂体培養細胞PRL分泌に対する効果

灌流液は5分毎に採取した。□はOPC-4392を作用させた時間を表わす。

Fig. 2-4

Superfusion系における $DA^{-5}M$ の下垂体培養細胞 PRL 分泌に対する効果
 灌流液は 5 分毎に採取した。□は DA を作用させた時間を表わす。

Fig. 2-5

Superfusion系におけるCB-154 $10^{-5}M$ の下垂体培養細胞PRL分泌に
対する効果

灌流液は5分毎に採取した。□はCB-154を作用させた時間を表わす。

Fig. 2-6

Superfusion系におけるTRH $10^{-7}M$ の下垂体培養細胞PRL分泌に対する効果

灌流液は5分毎に採取した。□はTRHを作用させた時間を表わす。

Fig. 2-7

Superfusion系におけるDA 10^{-5} M、OPC-4392 10^{-5} M存在下におけるTRH 10^{-7} Mの下垂体培養細胞PRL分泌に対する効果
 灌流液は5分毎に採取した。□はDA、OPC-4392、またはTRHを作用させた時間を表わす。

Fig. 2-8

Superfusion系におけるOPC-4392 10^{-5} M、CB-154 10^{-5} M
 存在下におけるTRH 10^{-7} Mの下垂体培養細胞PRL分泌に対する効果
 灌流液は5分毎に採取した。□はOPC-4392、CB-154またはTRH
 を作用させた時間を表わす。

第3章 生体におけるOPC-4392
によるPRL分泌調節系の解析

1. はじめに

PRLの生理作用はきわめて多種多彩にわたっているが、哺乳類においては、種の保存に関わる生殖においても非常に大きな役割をはたしている。PRL (Prolactin)はその名のとおりに泌乳の維持に必須なホルモンである。ラットにおいては、妊娠前期、あるいは偽妊娠における機能黄体の維持に必須でありPRLなしに妊娠は成立しない(鈴木と高橋、1979)。また雄においてもライディヒ細胞へのLHレセプターを増加させる作用を介してのテストステロン産生を増強する作用(Hafeez et al., 1972)、また精子形成や副性腺にたいしても、テストステロンに対する作用を増強すること(Bartke et al., 1970)が知られている。しかしながら、なんらかの原因で病的な過剰分泌がおこると無排卵症、精子減少症等、逆に生殖系に対して、重大な支障をきたすことがヒトにおいてよく知られている(Kannan, 1987)。これらのことより、PRL分泌調節系が哺乳類の種の保存にとってきわめて重要な役割を果たしていることが理解される。

下垂体のPRL分泌は、視床下部の抑制因子と促進因子との相反支配によって制御されている。PRL分泌制御は常態では抑制支配優位であり、その抑制因子の主体は、TIDAより分泌されるDAであるとされる。かつては、DAによるin vivoのPRL分泌抑制効果は、視床下部PIFの増加を介したものと見解も示された(kamberi et al., 1971)が、DAは、第1章、第2章での実験においても示される通りin vitroにおいて下垂体レベルでのPRL分泌を強く抑制し、DAアゴニストでも同様の効果を持つことから、最近では、DAのPRL分泌抑制作用は専ら下垂体に対する直接作用と考えられている(Ben-Jonathan, 1985)。

生体内においてDAはチロシンよりチロシン水酸化酵素によってドーパに変

換され、さらに芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素によって合成される (Nagatsu et al., 1964)。DAは、他のカテコルアミン、すなわちアドレナリン、ノルアドレナリンの前駆体としてのみ考えられてきたが、その後、DAニューロンに独立して存在することが明らかにされ (Moore and Bloom, 1978)、DAが神経伝達物質そのものとして認識されるに至った。DA系ニューロンは前記TIDA (隆起漏斗系)の他に黒質-線状体系、中脳-皮質系、中脳-辺縁系、脳室周囲系等が存在し (田中と白川, 1985)、運動機能、内分泌、情動機能など多様な機能を有しているといわれている。PRL分泌はストレス (Ajika et al., 1972)、吸入刺激 (Grosvenor and Whitworth, 1974)、子宮頸管刺激 (Freeman et al., 1974) などによって誘起されるが、このような刺激は、脳内中枢を介したものと考えられ、この際、これらのDA系ニューロンがTIDAニューロンを含めて、間接的にPRL分泌にかかわっている可能性も否定できないと思われる。しかしながら、脳内DA作用と下垂体DA作用を生体内でうまく分離する手段がなかったためあって、この問題に関しては殆ど関心が持たれていなかった。従来のDAアゴニスト、DAアンタゴニストでは、脳内DA作用部位、下垂体DA作用部位両者同時にアゴニスト、またはアンタゴニストの作用を現わしてしまい、PRL分泌の変化が脳内DA作用部位で起こったのか下垂体DA作用部位で起こったのかは理論的には解明できず、仮に脳内でのPRL分泌に対する影響に変化が現れたとしても下垂体への直接作用に隠されてしまう可能性がある。また血液脳関門を通過できないとされるDA、またはDAアンタゴニストのドンベリドン (Kannan, 1987) 等では、脳内DA系に影響が及ばないことから下垂体へのDA作用部位への直接効果しか観察し得ないことになる。

OPC-4392は、これらのDAアゴニストやDAアンタゴニストと異なり脳内では、シナプス後D2レセプターにはアンタゴニストとして、オートレセプターにはアゴニストとして作用すると考えられており (すなわち、脳内

DA系に対してはDAを強力に抑制する方向に作用する)、また下垂体DAレセプターには第1章の結果よりアゴニストとして作用することが明らかとなった。従ってOPC-4392を生体に投与し、PRL分泌の挙動を解析することによってPRL分泌に対する脳内DAの関与に対する知見の得られることが期待される。

視床下部での存在が証明されておりin vitroにおいてPRL分泌を促進する生理活性物質が多数見いだされている(McCann, 1982)にもかかわらずPRL分泌促進系の全体像については必ずしも十分明かにされていない。生理的なPRL分泌相にDAまたはCB-154を投与しても、第2章で示されたようにこれらがPRF作用をも抑制してしまう可能性があること、あるいは、DA系の抑制支配を解除しただけでPRL分泌が大幅に増加する可能性があること等から、生体内におけるPRL分泌促進系の解析には困難が伴う。ところが、第2章の結果よりOPC-4392は、DA、CB-154とは異なりTRHによるPRL分泌刺激作用に対する抑制効果を殆ど持たないことが示された。従って、OPC-4392を投与することによってDAレセプターを介したPRL分泌抑制効果を保有しながらも、PRFに対する反応性を残した状態が生体内で実現されること考えられ、生理的PRL分泌相に投与することによって、PRL分泌がDAの抑制解除であるのかPRFが関与したものであるのかも明らかにすることができると考えられる。

交尾刺激あるいは、人工的な子宮頸管刺激がない場合、ラットは排卵後に黄体相を実質的に持たず普通4日の短いサイクルで性周期が回帰するが、子宮頸管刺激により誘起される1日2回のPRLサージによってプロジェステロンを分泌する機能黄体が導入され偽妊娠が起こり約14日間継続する(DeGreef et al 1977)。PRLは機能黄体の維持すなわち偽妊娠の維持に必須であり、なんらかの方法によってPRLサージを阻止すると機能黄体は退行し偽妊娠は早

期に終了することが知られている。したがって、偽妊娠の阻止を指標としてOPC-4392のPRL分泌に対する抑制効果を検討することができる。

以上の背景により、本章では、OPC-4392を中心としたDAアゴニストの生体内におけるPRL分泌に対する作用を以下のPRL分泌モデル動物を対象にした。

1. 視床下部支配下（抑制優位）の下垂体を持つラット：

正常雄ラット

2. 視床下部抑制支配のみを解除した下垂体を持つラット：

レゼルピン投与雄ラット

3. 視床下部支配から完全に解除された下垂体を持つラット：

Autograftラット

4. 視床下部支配下にある下垂体と視床下部支配から完全に解除した下垂体

を合わせ持つラット：

Isograftラット

5. 生理的PRL分泌相を持つラット：

偽妊娠ラット

II. 材料と方法

1. 動物

当教室で継代繁殖した成熟ウィスター系ラット（3～4カ月令）を使用した。雌ラットは毎日膣スメアを観察し、4日の規則正しい性周期を示す動物を用いた。

飼育条件は第1章と同一である。

2. 他家下垂体移植ラット（isograftラット）の作出

Donorおよびrecipientとも雄ラットを使用した。エーテル麻酔下で背部切開よりrecipientラットの左腎を露出させた。次に、donorラットを断頭、下垂体を取り出し、油性ペニシリン液に浸漬した。先に露出したrecipientラットの左腎被膜下にメスで1～2mmの切口をつくり、ガラス製ブランジャーを挿入、被膜の1部を臓器実質よりはがしポケットを作った。移植する下垂体を移植用ピペットに移し、ポケットにピペットの先を入れ、ブランジャーで下垂体をピペットより腎被膜ポケットに挿入した。ピペットとブランジャーをポケットより抜き取り、ブランジャーで、下垂体を被膜の外側より原型に近い形に広げ、ポケットの最深部に押し込み、ポケット内に溜った血液、ペニシリンを除き、腎を腹腔内に戻し縫合した。移植後、少なくとも1週間を経たのち動物を実験に供した。

3. 自家下垂体異所移植ラット (autograftラット) の作出

雄ラットの下垂体を周咽頭法 (本間、1953) により摘出した。摘出した下垂体を isograftラットの作出と同様の方法で自己の左腎包膜下に移植した。移植後少なくとも1週間を経た後、動物を実験に供した。

4. 偽妊娠ラットの作出

18~19時に、発情前期の雌ラットにガラス棒で子宮頸管を約100回圧迫した。子宮頸管刺激を加えた日の翌日を偽妊娠第0日と定義し、第1日より3日間連続して膣スメアが非発情期像を示した動物を、偽妊娠が成立したと判定し、実験に使用した。

5. レゼルピン投与ラット

5%グルコース液に酢酸を最少限滴下して溶解させたレゼルピン (Sigma) を 10 mg/kg の用量で、雄ラットに実験開始5時間前に腹腔内に投与した。

6. 正常雄ラット、レゼルピン投与ラット、iso-graftラット、autograftラットへの OPC-4392 あるいは 3-ppp の投与

OPC-4392 は、0.1 M 乳酸に加温溶解し、経口投与、または軽いエーテル麻酔下で、大腿静脈より投与した。3-ppp は、生理食塩水に溶解し、軽いエーテル麻酔下で、大腿静脈より投与した。対照動物には、溶媒 (0.1 M

乳酸)のみを投与した。

実験群を下表に示した。

実験群	処置	
正常雄ラット	OPC-4392	0.5mg/head p. o.
	"	1.5mg/head p. o.
	"	5 mg/head p. o.
	"	5mg/kg i. v.
	0.1 M 乳酸 (対照)	i. v.
レベリン投与正常雄ラット	OPC-4392	5mg/kg i. v.
autograftラット	OPC-4392	1mg/kg i. v.
	"	5mg/kg i. v.
	3-ppp	5mg/kg i. v.
	0.1 M 乳酸 (対照)	i. v.
isograftラット	OPC-4392	1mg/kg i. v.
	"	5mg/kg i. v.
	0.1 M 乳酸 (対照)	i. v.
レベリン投与isograftラット	OPC-4392	5mg/kg i. v.

p. o. 経口投与 i. v. 静脈投与

7. 偽妊娠ラットへのOPC-4392、CB-154の投与

0. 1 M乳酸に溶解したOPC-4392を軽いエーテル麻酔下で大腿静脈または腹腔内に投与した。実験の一部では、0.1 M乳酸のみを投与した実験群を対照とした。3%酒石酸に溶解したCB-154は、皮下に投与した。投与量、投与回数、投与日時を実験群ごとに下表に示した。

OPC-4392投与群

偽妊娠第4日0時	5mg/kg i. v. × 1
偽妊娠第4日15時	5mg/kg i. v. × 1
偽妊娠第4日0時、3時	5mg/kg i. v. × 2
偽妊娠第4日0時、6時、12時、18時、 5日0時、6時、12時、18時、	5mg/kg i. v. × 8
偽妊娠第4日0時	30mg/kg i. p. × 1
偽妊娠第4日0時12時、5日0時、12時、	30mg/kg i. p. × 4
偽妊娠第7日0時12時、8日0時、12時、	30mg/kg i. p. × 4

0.1 M乳酸投与群 (対照群)

偽妊娠第4日0時	i. v. × 1
偽妊娠第4日15時	i. v. × 1
偽妊娠第4日0時、3時	i. v. × 2

CB-154投与群

偽妊娠第4日0時	1.5mg/kg s. c. × 1
偽妊娠第7日0時	1.5mg/kg s. c. × 1

i. v. 静脈投与、i. p. 腹腔内投与、s. c. 皮下投与

8. 採血

経口投与群では、OPC-4392投与前、投与1、2、4、6、8、24時間後に、断頭によって採血を行なった。血液は4℃で凝固させ、遠沈、血清を分離した。OPC-4392または3-ppp静脈投与群の採血は、原則として、OPC-4392、3ppp投与直前、投与0.5、1、2、4、6、24時間後の各時間に行なった。正常雄ラット、レゼルピン投与ラットは、無麻酔で尾端静脈を切開し、ヘパリンでコートしたキャピラリーで採血し、遠沈、血漿を分離した。Isograftラット、autograftラットは、軽いエーテル麻酔下で心臓せん刺により、血液を採取し4℃で凝固させ、遠沈、血清を分離した。

偽妊娠動物の一部については、偽妊娠第4日にOPC-4392または0.1M乳酸投与後3時間毎の、無麻酔での尾端静脈切開による採血を行なった。血漿および血清はホルモン測定まで-20℃で凍結保存した。

9. PRLの測定

血漿および血清中のPRLは第1章と同一の方法でラジオイムノアッセイにより測定した。

10. 統計

平均値の差の検定はStudent's *t* testによって行ない危険率5%以内をもって有意水準とした。

III. 結果

1. 正常雄ラットの血中PRL濃度に対するOPC-4392の効果

1) OPC-4392の経口投与、断頭採血によるPRL濃度への効果

OPC-4392 0.5~5 mg/headを正常雄ラットに経口投与した結果(Fig. 3-1)、0.5 mg/headの投与では、血中PRL濃度は平均値で投与前(0時間)の8.1 ng/mlに比べ投与後6時間で11.2 ng/ml および8時間で10.2 ng/mlと上昇傾向がみられるものの、有意差は認められなかった。1.5 mg/headの投与では投与後の血中PRL濃度の平均は6.5~9.8 ng/mlの値を示し、投与前の血中PRL濃度(9.4 ± 2.5 ng/ml 平均値 ± 標準誤差)に差を認めなかった。5 mg/headの投与によっては、血中PRL濃度は、投与前9.0 ng/mlに比べ、投与後4時間(3.2 ng/ml)、6時間(3.1 ng/ml)、8時間(4.0 ng/ml)、24時間(4.6 ng/ml)といずれも有意差は認められないものの投与前と比べて低値を示した。

2) OPC-4392の静脈内投与、尾静脈採血による血中PRL濃度への効果

OPC-4392 5 mg/kg、または対照として0.1 M乳酸のみを正常雄ラットに投与した結果(Fig. 3-2)、両者ともに投与後血中PRL濃度は、低下した。しかしながら、OPC-4392の5 mg/kg投与後の血中PRL濃度は対照に比べ0.5時間(12.4 ± 0.7 vs 34.1 ± 4.2 ng/ml)、4時間(8.8 ± 1.9 vs 39.1 ± 5.5 ng/ml)で有意に低く、投与後2時間を除く他の時点においてもOPC-4392投与群

の血中PRL濃度の平均値は、対照群に比べ低い値を示した。

2. レゼルピン投与正常雄ラットにおけるOPC-4392の血中PRL濃度に対する効果

レゼルピン10mg/kgを正常雄ラットに投与5時間後にOPC-4392 5mg/kgを投与したときの血中PRL濃度の推移をFig. 3-3に示した。レゼルピンの投与によって、血中PRL濃度は、無処置正常雄ラット(図中-5h, 9.0 ± 2.1 ng/ml)に比べ投与後4時間(図中-1h, 34.0 ± 2.9 ng/ml)と有意に上昇した。

レゼルピン投与後5時間目にOPC-4392(5mg/kg)を投与した。この投与によって、血中PRL濃度は投与後0.5時間(8.8 ng/ml)には、投与直前(図中0h, 30.4 ng/ml)に比べて有意に低下し、血中PRL濃度の有意な低下はOPC-4392投与後4時間まで続き、6時間後には 29.2 ± 4.3 ng/mlとOPC-4392投与前のレベルまで上昇した。OPC-4392投与後24時間すなわちレゼルピン投与後29時間後の血中PRL濃度は平均 40.9 ng/mlでなおレゼルピンによるとみられる上昇した血中PRL濃度が観察された。

3. 下垂体移植ラットにおけるOPC-4392、3-pppの血中PRL濃度に対する効果

下垂体移植ラットのOPC-4392、3-ppp投与後の血中PRL濃度は投与前のPRL濃度に対するパーセンテージで表わした。下垂体移植ラットの血中PRL濃度の平均は、正常雄ラット(8.8 ± 2.4 ng/ml)に比べ

高値を示し、autograftラットでは、 $23.1 \pm 5.0 \text{ ng/ml}$ と正常雄ラットの2.5倍程度、isograftラットでは、 $180.8 \pm 40.4 \text{ ng/ml}$ と正常雄に比べ約20倍の値であった(Fig. 3-4)。

1) AutograftラットにおけるOPC-4392の血中PRL濃度に対する
効果

Autograftラットに、OPC-4392投与した結果をFig. 3-5に示した。対照群の0.1M乳酸投与によっては血中PRL濃度に影響を与えなかった。これに対し、OPC-4392 1mg/kg投与群では、投与後0.5時間で投与前の69.1% (平均値)、1時間で60.9%、2時間で38.6%と血中PRL濃度は低下し、投与後6時間まで、投与前の約35%の低値を推移した。投与後24時間では、血中PRL濃度は、79.5%まで上昇したものの、対照群の血中PRL濃度に比べ有意に低かった。OPC-4392 5mg/kg投与群においても血中PRL濃度の推移は、投与後6時間まで1mg/kg投与群とほぼ同様の経過をたどり、さらに投与後24時間の血中PRLは、投与前の59.6%までしか回復しなかった。

2) Autograftラットにおける3-pppの血中PRL濃度に対する
効果

3-ppp 5mg/kgの投与によって血中PRL濃度は、投与後0.5時間から4時間にわたって低値(投与前のレベルの30~50%)を示した後、投与後6時間、24時間でそれぞれ投与前のレベルの85.2%、71.0%まで上昇した(Fig. 3-6)。

3) IsograftラットにおけるOPC-4392の血中PRL濃度に対する効果

IsograftラットにOPC-4392を投与した結果をFig. 3-7に示した。対照とした0.1M乳酸投与群では、投与による血中PRL濃度への影響は認められなかった

OPC-4392 1mg/kgの投与によって血中PRL濃度は、0.5時間から4時間にわたって著しく低下したが、autograftラットの場合(Fig. 3-5)と異なり、投与後6時間で血中PRL濃度は投与前のレベルまで回復した。OPC-4392 5mg/kg投与群においては、1mg/kg投与群に比べ血中PRL濃度の抑制時間の延長が観察され、血中PRL濃度の著しい低下は投与後少なくとも6時間まで継続したが、投与後24時間ではほぼ投与前のレベルまで上昇し、autograftラットで観察された、OPC-4392投与後24時間での血中PRL濃度の低下は認められなかった。

4) レゼルピン投与isograftラットにおけるOPC-4392の血中PRL濃度に対する効果

レゼルピンによってはisograftラットの血中PRL濃度は有意に上昇しなかった(投与前 112.9 ± 16.0 ng/ml、投与後 128.1 ± 41.3 ng/ml)。

OPC-4392 5mg/kgの投与によって血中PRL濃度は投与後4時間にわたってOPC-4392投与前のレベルの20%前後まで低下した。投与後6時間では約51.5%まで上昇し、24時間後にはばらつきは大きいものの投与前を上回るレベル(166.3 ± 52.7 %)まで上昇した(Fig. 3-8)。

4. OPC-4392あるいはCB-154の偽妊娠維持に対する影響

OPC-4392を偽妊娠ラットに投与し、CB-154と同様に偽妊娠を阻止できるか否かを検討した (Table 3-1)。

偽妊娠第4日0時にOPC-4392 5mg/kgまたは、30mg/kgを投与したが、膣スミア像は偽妊娠第13~16日まで発情休止期像(白血球像)を示し、偽妊娠は阻止されなかった。そこでOPC-4392の投与回数を増やし偽妊娠第4日または第7日0時よりの12時間ごとの30mg/kgの4回の投与、あるいは偽妊娠第4日0時よりの6時間毎の8回の投与を行なった。しかしながら、どの処置においても偽妊娠を阻止することはできなかった。

これに対し偽妊娠第4日0時のCB-154(1.5mg/kg)の単一投与によって、第6日に全例の膣スミアは発情前期像に変化した。第7日0時に同量のCB-154を単一投与しても、第9日または第10日で膣スミアは発情前期または発情期像を示し、偽妊娠はCB-154によって完全に阻止された。

5. 偽妊娠ラットにおけるPRLダイアーナルサージ、ノクターナルサージに対するOPC-4392の効果

OPC-4392によっては偽妊娠が阻止されないという前節の実験結果の原因を探るため、偽妊娠時における1日2回のPRLサージ(ダイアーナルサージ、ノクターナルサージ)の直前にOPC-4392を投与し、2つのサージ出現に対する影響を検討した。

1) ダイアーナルサージに対するOPC-4392の効果

偽妊娠第4日の15時にOPC-4392 (5 mg/kg) または対照として0.1 M乳酸を投与した (Fig. 3-9)。

0.1 M乳酸のみの投与では、3例中2例において21時に血中PRL濃度は大幅に増加し、その値は738.2および845.5 ng/mlであり、ダイアーナルサージの出現が確認された。OPC-4392投与群では、3例中1例に21時に血中PRL濃度の上昇傾向 (218.2 ng/ml) を認めたものの他の2例においては血中PRL濃度の上昇は認められなかった。従って、OPC-4392 5 mg/kgの投与によってダイアーナルサージが抑制されることが示された。

2) ノクターナルサージに対するOPC-4392の効果

偽妊娠第4日0時にOPC-4392 (5 mg/kg) または対照として0.1 M乳酸を投与した (Fig. 3-10)。

乳酸投与群では、3例中1例が3時に残る2例が6時に血中PRL濃度の急増が観察されノクターナルサージが確認された。

OPC-4392投与群においても4例中全例に6時にノクターナルサージが認められ、0時に5 mg/kgを単一投与しても、ノクターナルサージは抑制されないことが示された。

OPC-4392の投与回数を増やし偽妊娠第4日の0時と3時に5 mg/kg宛2回投与を行なった結果 (Fig. 3-11)、0.1 M乳酸2回投与群 (対照群) の5時の血中PRL濃度 (599.0 ± 98.0 ng/ml) に比べ有意に低いものの (278.8 ± 59.2 ng/ml)、OPC-4392 2回投与群においても、明らかにノクターナルサージの出現が観察された。その

後8時より17時にかけて、OPC-4392 2回投与群、対照群とも血中PRL濃度は低値(40~150ng/ml)を示した後、20時で、両者ともに血中PRL濃度は、大幅に上昇し、ダイアーナルサージが認められた。

IV. 考察

DAやDAアゴニストの生体への投与が血中PRL濃度を減少させること、また、DAアンタゴニストの投与が、血中PRL濃度を上昇させることがよく知られている(Kannan, 1987)。

第1章、第2章の結果により、OPC-4392は、下垂体に対しほぼDAアゴニストの性質を表わすことが明らかにされた。また脳内DAレセプターの、オートレセプターに対してはアゴニストとして、シナプス後D2レセプターに対してはアンタゴニストとして働くので、脳内DA活性は抑制された状態になると考えられる。

DAアゴニストのCB-154やpiribedil(ピリベジル)の処置によって、脳内DAニューロン自体の活動は減少し、ハロペリドールのようなDAアンタゴニスト処置によって脳内DAニューロン自体の活動は増加する(Moore and Wuerthele, 1979)。このような、代償的な活動の増減は、オートレセプター及び神経的なフィードバックループにアゴニスト、アンタゴニストが作用した結果と考えられている。ところが、TIDAニューロンはこれらのDAアゴニスト、アンタゴニストに対して他のDAニューロンと異なり、短時間では直接応答しないことが知られている(Gudelsky and Moore, 1976)。例えば、ハロペリドールによって、TIDAニューロンの活性上昇が起こるが線条体DAニューロンのそれに比べて非常に遅れ、血中PRL濃度の上昇に同期しておこること、そして、このTIDAニューロンの活性上昇は、下垂体除去ラットでは全く起こらないことから、この活性上昇はPRLがショートフィードバック様式によってTIDAニューロンの活性を調節した結果と理解され、TIDAニューロンのオートレセプターの働きによるとは考えられていない。言いかえれば

TIDAニューロンにはDAオートレセプターは存在しないと考えられている (Demarest and Moore, 1979; Moore, 1987)。したがって、OPC-4392を生体に作用させた場合、TIDAニューロンそれ自体の活性に影響を与えない、すなわち門脈中のDAには変化を与えないことが予想される。

実験的にPRL分泌を昇進させたラットにおいてのOPC-4392の投与によって著しく血中PRL濃度が減少することが示され (Fig. 3-3, 3-5, 3-7, 3-8)、とくに、正位下垂体をもたず、視床下部の抑制的支配から完全に開放された下垂体をもつautograftラットでもOPC-4392によって、血中PRL濃度が減少したこと (Fig. 3-5) より、この効果は、下垂体に対する直接作用であり、第1章、第2章でin vitroで示されたDAレセプターに対するアゴニスト作用が、in vivoにおいても発現されることが明らかとなった。また3-pppがautograftラットにおいてPRL分泌を抑制すること (Fig. 3-6) (Meltzer HY and Simonovic, 1981) から、in vivoにおいてもいわゆるオートレセプターアゴニストは、下垂体DAレセプターに対してアゴニスト作用を持つことが確認された。

正常雄ラットのOPC-4392の投与実験では、経口投与断頭採血によるもの (Fig. 3-1) と、静注投与で尾静脈採血 (Fig. 3-2) の2種類の方法によって血中PRL濃度の推移を検討したが、基礎レベルの血中PRL濃度が断頭採血では、 10 ng/ml なのに対し尾静脈採血では、 40 ng/ml と非常に高い値を示し、尾静脈採血によるストレスによって血中PRL濃度が上昇していることが考えられた。従って、経口投与断頭採血の方法による結果の方が、正常雄ラットに対するOPC-4392の効果を正確に反映していると考えられる。経口投与断頭採血では、低用量のOPC-4392では、血中PRL濃度に変化を与えず、高濃度の投与では、血中PRL濃度を低下させる傾向を示した (Fig. 3-1)。前述のように、OPC-4

392は、TIDAニューロンに影響を与えないものと考えられるので、この結果はOPC-4392が、正常雄ラットの下垂体門脈血中に高濃度に存在すると推定される内生的DAに対してアンタゴニスティックな効果を持たないことを示すものと考えられ、OPC-4392はin vivoにおいても下垂体DAレセプターには、専らアゴニストとして作用するものと考えられた。また、静注投与、尾静脈採血動物にみられたOPC-4392による血中PRL濃度の減少は、ストレスによって、上昇したPRL分泌がOPC-4392によって抑制されたものと判断される。

OPC-4392をautograftラットとisograftラットに投与した場合の血中PRL濃度の変化に差異が認められた。すなわちOPC-4392の投与によって、autograftラットの血中PRL濃度は初期値の30%までしか低下しなかったのに対し(Fig. 3-5)、isograftラットでは、初期値の3%まで低下した(Fig. 3-7)。ところで、autograftラットの血中PRL濃度の絶対値は、isograftラットそれに比べて1/8しかなかった(Fig. 3-4)。下垂体を異所に移植して視床下部の支配から切り放すと、PRL、GHを除く他のホルモンは殆ど分泌されなくなる。雌ラットでは、エストロジェンは下垂体に直接作用して、PRLの合成(Gorski et al., 1981)、分泌(Andrews and Ojita 1977)、PRL分泌細胞(ラクトロフ)の増加(Stevens and Hefenstein, 1966)を促進することがよく知られているが、雄では、この役をテストステロンが果たしている(Shin et al., 1974; Herbert et al., 1977)。Autograft雄ラットの血中PRL濃度がisograftラットに比べて低いことの大きな原因の一つは、正位下垂体の欠如によるゴナドトロフィンの著しい減少によって精巣退行が起こりテストステロンの減少が継発するためと推定される。OPC-4392のautograftラットとisograftラットの血中PRL濃度に対する相対的効果の差は、両者の下垂体のPRL分泌活性の差によるものと考えられ、

PRL分泌活性が高いほどDAレセプターを介した抑制に強く反応するものと判断された。この現象は1種の代償性反応であると理解される。

またOPC-4392による血中PRL濃度の低下すなわちOPC-4392の抑制効果持続時間の長さにおいてもautograftラットとisograftラットの間には差異が認められた。すなわち、autograftラットでは、1mg/kg、5mg/kgのOPC-4392の投与によって、少なくとも24時間にわたって、抑制効果がみられたのに対し(Fig. 3-5)、isograftラットでは、1mg/kgでは、6時間後に、5mg/kgでの遅くとも24時間後には、血中PRL濃度は初期値のレベルまで完全に回復し、抑制時間の短縮が認められた(Fig. 3-7)。Autograftラットには存在しない正位の下垂体がある原因によって、PRL分泌の昂進を起こし、その結果抑制時間の短縮が起こったものと思われる。以下この点を考察する。

Isograftラットでは、腎被膜下の下垂体による継続的高PRL状態が存在するから、TIDAニューロンは当然この状態に反応し、内生的にPRL分泌抑制機構が発現しDA活性が上昇しているはずであって、従って正位下垂体のPRL分泌は、抑制された状態にあると考えられる。OPC-4392の投与によって血中PRL濃度が下がり、それに連れてTIDAニューロンより分泌されるDAが減少し、正位下垂体のPRL分泌が上昇する可能性が考えられる。しかしながら、門脈中のDAが減少しても正位下垂体は依然としてOPC-4392投与によるこの薬物のPRL分泌抑制を、autograftラットと同様に受けているはずであり、このことは両者の差異を説明し得ない。レゼルピンは、脳内のシナプスのDAを含めたカテコールアミンを長時間にわたって枯渇させる作用を持ち(Anden, 1967)、これを投与すれば、TIDAニューロンにおけるDAの枯渇が主因となり、血中PRL濃度の上昇が起こるとされる(Eriksson et al 1983)。ところがレゼルピンをisograftラットに投与したところ、血中

PRL濃度には変化がなく(投与前 $112.9 \pm 16.0 \text{ ng/ml}$ vs 投与後 $128.1 \pm 41.3 \text{ ng/ml}$)、isograftラットにおいてはTIDAニューロンの活性を減少させて正位下垂体からのPRL分泌の上昇をはかっても、総体として血中PRL濃度の上昇に寄与しないことが判った。先に、移植した下垂体由来の高PRL血症によりTIDAニューロンの活性が上昇していると推論したが、このような上昇は実際には起こっていない可能性も考えられる。さらにisograftラット(Fig. 3-8)あるいは正常雄(Fig. 3-3)にあらかじめレゼルピンを投与し、血中PRL濃度を上昇させた状態のラットにおいてのOPC-4392 5 mg/kg 投与による血中PRL濃度の変化を調べたところ、isograftラットの場合には、レゼルピンを投与しないとき(Fig. 3-7)と同様に24時間後に、また、正常雄ラットでは、6時間後には、血中PRL濃度はほぼ初期の値まで上昇した。

以上のことより、正位下垂体を持つ正常、あるいは、isograftラットが、autograftラットに比べてOPC-4392のPRL分泌抑制効果が短期間しか発現しない原因は、正位下垂体に対する内生的DA供給の減少によるものではないことは明らかである。つまり、OPC-4392の投与は、正位下垂体からのPRL分泌を促進する効果があるためと考えられる。

In vitroでDAが視床下部TRH分泌を抑制するとの報告がある(Joseph-Bravo et al 1979)。また、ラット正中隆起外層の下垂体門脈系の毛細血管の周囲で、 $[^3\text{H}]$ -DAで標識される終末が、TRH様免疫陽性細胞に密接している像が電子顕微鏡によって観察されており、このDA含有終末が、TRH終末にaxo-axonicに接触してしてTRHの分泌に影響を与えている可能性が考えられている(Nakai et al 1983)。また第2章の結果より、OPC-4392はTRHのPRL分泌刺激作用に対して抑制作用を殆ど示さなかった。

これらのことと、本章で観察されたように、in vivoでOPC-4392を投

与した場合は *in vitro* で期待されるような PRL 血中レベルの低下が起こらないことから、OPC-4392 は下垂体レベルで作用するとともに、TRH または他の PRF 分泌ニューロンに DA 系支配がおよんでその系に対しても作用している可能性がある。つまり、PRF 分泌ニューロンがドパミン作動性ニューロンの後シナプスニューロンとなっている可能性である。もしそうであれば、OPC-4392 はシナプス後 D2 レセプターにはアンタゴニスト効果を持つから PRF ニューロンには DA 作動性の抑制から解除され、その結果、PRF が分泌され結果的に正位下垂体をもつラットでの PRL 分泌抑制期間の短縮として観察されると考えることができる。このような機序が存在するとすれば、正常ラットに OPC-4392 を投与した際に脳内の PRF 分泌細胞に存在するシナプス後 D2 レセプターに OPC-4392 がアンタゴニストとして働き PRL 分泌の上昇が観察されるかも知れない。しかし実際にはこのような現象は起こらなかった。これは、TIDA ニューロンにオートレセプターが欠損しているためかも知れない。すなわち OPC-4392 によっては、TIDA ニューロンの活性は影響を受けず、従って門脈内 DA は変化しない。このような状態で PRF 分泌細胞に存在するシナプス後 D2 レセプターに OPC-4392 がアンタゴニストに働いて、たとえ PRF が分泌されたとしても、第 2 章において見られたように内生的な DA によって PRF の PRL 分泌刺激は、強く抑制されてしまうと考えることができる。

正常ラットにレゼルピンを投与したときには、内生的 DA 活性は減少してしまうので、PRF による PRL 分泌刺激効果が、より明瞭に現れるはずである。とはいえ、OPC-4392 の *in vivo* 投与では、下垂体に対する PRL 分泌抑制の直接作用を除くことはできない。したがって、PRF の関与の有無は、OPC-4392 の PRL 分泌抑制の *autograft* ラットにくらべての抑制時間の短縮として現れるものと推定される。なお CB-154 のようなアゴニストはシ

ナブス後D2レセプターにもアゴニストとして働くから、投与すればPRFの低下と下垂体DAレセプターを介したPIF活性の上昇を招くからPRL分泌は一方向的に抑制されることになる。

ラットでは黄体の機能化およびその維持にPRLが必須である (Smith et al., 1975)。子宮頸管刺激に継発する神経-内分泌反射によってPRLの大量放出が誘起され黄体が機能化され、以後1日2回のPRLサージ(3時~6時に認められるノクターナルサージ、17時~21時に認められるダイアーナルサージ)によって黄体の機能が維持される (Bucther et al., 1972; Freeman 1974)。妊娠が成立しない場合黄体は約14日で退行し偽妊娠は終了するが、これより早い時期にCB-154などのDAアゴニスト作用を有する麦角アルカロイド (Frückiger and DelPozo, 1979) や、脳内にPRL (Voogt and Meites, 1971) を投与すると偽妊娠を中断させ得ることが報告されている。上の二つの例は、これは、それぞれ外生的、内生的にDA活性を高めることによってPRL分泌を阻害し黄体を退行させた結果である。ラットの偽妊娠の維持すなわち黄体機能の維持は、プロジェステロンを生理活性の無い20 α -ダイヒドロプロジェステロンに変換する20 α -水酸基脱水素酵素(20 α -HSD)の活性をPRLが抑制することによって行なわれており、in vivoにおいて40時間以上PRLの感作を受けないような状態にすると、20 α -HSD活性が上昇し黄体が退行するが、この過程は不可逆であり (Matsuda et al., 1990)、偽妊娠は終了または中断する。したがって、40時間以上、内生的なPRL分泌を抑制すれば、偽妊娠は中断されるはずである。OPC-4392は下垂体のPRL分泌をin vitro(第1章)、in vivo(本章)において強く抑制することから偽妊娠を中断させ得ることが予想された。

ところが、CB-154では、1.5 mg/kgの単一投与で偽妊娠が中断されるのに対し、OPC-4392の5 mg/kg、30 mg/kgの単一投与

では、偽妊娠を中断することはできなかった (Table 1)。OPC-4392はCB-154に比べてPRL抑制効果が弱いことが、本研究において示唆されてきたので投与量、投与回数を増加させ、偽妊娠の中断を試みた。本章のisograftラット、autograftラットでの実験によって5mg/kgのOPC-4392の投与によって、少なくとも6時間にわたってPRL分泌を抑制するはずである。従って、6時間毎の2日間にわたってOPC-4392 (5mg/kg)を投与にすることによって、偽妊娠が中断することが予想された。しかしながら、このような処置を行なってもなおかつOPC-4392によっては偽妊娠を中断させることができなかった (Table 1)。したがって、偽妊娠のPRLサージの発現機序の中に、CB-154では抑制でき、OPC-4392には抑制できないメカニズムが、存在することが強く示唆された。

偽妊娠における2つのPRLサージ、ノクターナルサージとダイアーナルサージは、ストレス (Freeman et al., 1974)、ステロイド (Freeman and Sterman, 1978)、光周期 (Bethea and Neill, 1979)等に対する反応性が異なることが知られておりこの2つのサージの発現は独立した機序によって発現しているのではないかと考えられている。OPC-4392を2つのサージに作用させることによって、その反応に差がでることも予測され、それによって、新たな情報が得られることも期待できる。そこで、2つのサージの直前にOPC-4392を投与した結果、興味深いことに、ダイアーナルサージは阻止されるが (Fig. 3-9)、ノクターナルサージは、阻止されず (Fig. 3-10)、投与回数を増加させると、量的には抑制されるもののPRLサージそのものを抑制することはできなかった (Fig. 3-11)。したがって、OPC-4392の6時間毎の2日間にわたる投与によって、偽妊娠が中断できなかったのは、このノクターナルサージが阻止されず、24時間毎にPRL

が供給されるため、黄体が退行しなかったためと考えられた。以上の結果から、ダイアーナルサージは主に下垂体門脈血中のDAの減少によっておこり、OPC-4392によって阻止し得るものと考えられる。一方、ノクターナルサージは、PRFの関与が強く示唆され、DAの減少に加えて、CB-154によっては阻止されるがOPC-4392によっては阻止し得ないものと考えられた。

VIPが門脈中に高濃度に存在する事が知られている (Said and Porter, 1979; Shimatsu et al., 1981)。抗VIP血清で吸乳刺激やストレスによる血中PRL濃度の上昇を抑制すること (Abe et al., 1985) 等から、生理的PRFの一つである可能性が想定されている。またin vitroでPRL分泌刺激効果を持つPHI (Werner et al., 1983) が正中隆起 (Höckfelt et al., 1982) や門脈血 (Shimatsu et al. 1983) に存在することも知られている。これらのほかにもPRF活性のある、いくつかの神経ペプチドが存在しており (McCann, 1982)、これらのペプチドの全てあるいは一部がノクターナルサージに関与しているであろう。また、内側視索前野 (MPOA) の破壊によって偽妊娠が誘起される (Clemens et al., 1976) が、そのときノクターナルサージのみが観察されること、また、偽妊娠中にMPOAを破壊するとダイアーナルサージが消失し、ノクターナルサージのみが発現することが報告されている (Freeman and Banks, 1980)。MPOAの破壊によってTSH分泌が一過的に上昇することから (Aizawa and Creer, 1981) MPOAはTRH分泌を抑制している部位とも考えられる。従って、MPOAのノクターナルサージ抑制作用は、TRH分泌抑制作用と重複していることも考えられ、ノクターナルサージの発現にはTRHが強く関与していることも想像される。子宮頸管刺激をしたラットでは刺激しないラットにくらべて血中TSHが高いことも報告されているが (Castro-Vasques et al., 1981)、この原因は、MPOAからの脱抑制によるTRH分泌の昂進のためかも知れない。

CB-154は長期活性を示すDAアゴニストであることが知られている (Besser et al., 1977)。CB-154の単一投与によって偽妊娠が阻止されることから、適当量のCB-154は少なくとも40時間にわたって、PRL分泌を抑制し続けていることが示唆される。CB-154は、*in vitro*で、第1章で示したように静置培養において強いPRL分泌抑制作用を示し、第2章で示した如く *superfusion*系において負荷終了後にもPRL分泌を抑制し続ける。さらにTRHによるPRL分泌刺激も強く抑制した。これらのことより、CB-154の偽妊娠阻止効果は、下垂体レベルでのDAアゴニスト作用のみでも説明し得るものであり、実際そう考えられてきた。しかしながら、その存在が推定されたDA系によるPRFの抑制支配に対してもCB-154は効果を及ぼしている可能性が強い。もしそうであればCB-154を投与した条件ではPRFの不足も原因となってノクターナルサージは決して発現し得ない。すなわち、CB-154は、PRF分泌細胞に存在すると仮定した、シナプス後D2レセプターにアゴニストとして働き、PRF分泌を抑制することも考えられる。CB-154はおそらく下垂体レベル、脳内レベル両者のPRFに対する抑制効果によって、ノクターナルサージすなわち偽妊娠を中断させることができるものと思われる。

以上の結果から、生理的なPRL分泌相において、PRFが関与していること、さらにはこのPRFの分泌支配に脳内DA系が関与すること、すなわちOPC-4392を用いた解析によって、DAは下垂体の直接的なPRL分泌の抑制支配に加えて、脳内においてもPRF分泌を抑制することによって2重にPRL分泌を抑制的に支配していることが示唆された (Fig. 3-12 模式図)。

また、OPC-4392は、他の抗精神病薬 (Meltzer and Fang, 1976; Langer et al., 1977) のように *in vivo*で血中PRL濃度を上昇させず、*in vitro*ではPRL分泌を強く抑制する作用のあること、また血中PRL濃度

が上昇した状態では、血中PRL濃度を強く低下させる作用があることが示された。したがって、抗精神作用が確認されれば、副作用として高PRL血症を起さない新しいタイプの抗精神病薬となることが示唆され、さらに高PRL血症に対する治療薬としての有用性も示唆された。

第3章 图表

Fig. 3-1

正常雄ラットのOPC-4392経口投与後の血中PRL濃度の推移

○ 0.5mg/head、△ 1.5mg/head、● 5mg/head

採血は断頭により行なった。各点および縦線は平均値±標準誤差を示す。

Fig. 3-2

正常雄ラットのOPC-4392静脈投与後の血中PRL濃度の推移

● OPC-4392 5mg/kg、○ 0.1M乳酸(対照)。

各点および縦線は平均値±標準誤差を示す。*は $p < 0.05$ で対照群との間に有意差のあることを示す。

Fig. 3-3

レゼルピン投与ラットのOPC-4392投与後の血中PRL濃度の推移
 レゼルピン10mg/kg投与5時間後に、OPC-4392 5mg/kg
 を投与した。各点および縦線は平均値±標準誤差を示す。縦線を欠くものは点
 内に標準誤差が含まれる。

Fig. 3-4

正常雄ラット、autograftラット、isograftラットの血中PRL濃度
各棒の高さと縦線は平均値±標準誤差を示す。

Fig. 3-5

AutograftラットのOPC-4392投与後の血中PRL濃度の推移

○ OPC-4392 1mg/kg、● OPC-4392 5mg/kg、
 ▲ 0.1M乳酸(対照)。値は、各群のOPC-4392投与直前の血中PRL濃度(図中0h)に対する%で表わした。各点および縦線は平均値±標準誤差を示す。*、**、***は、それぞれ、 $p < 0.05$ 、 $p < 0.01$ 、 $p < 0.001$ で対照群との間で有意差のあることを示す。

Fig. 3-6

Autograftラットに対する3-ppp 5mg/kg投与後の血中PRL濃度の推移

値は、各群のOPC-4392投与直前の血中PRL濃度(図中0h)に対する%で表わした。各点および縦線は平均値±標準誤差を示す。

Fig. 3-7

IsograftラットのOPC-4392投与後の血中PRL濃度の推移

○ OPC-4392 1mg/kg、● OPC-4392 5mg/kg、
▲ 0.1M乳酸(対照)。値は、各群のOPC-4392投与直前の血中PRL濃度(図中0h)に対する%で表わした。各点および縦線は平均値±標準誤差を示す。*、**、***は、それぞれ、 $p < 0.05$ 、 $p < 0.01$ 、 $p < 0.001$ で対照群との間で有意差のあることを示す。

Fig. 3-8

レゼルピン投与isograftラットのOPC-4392投与後の血中PRL濃度の推移

レゼルピン10mg/kg投与5時間後に、OPC-4392 5mg/kgを投与した。値は、各群のOPC-4392投与直前の血中PRL濃度(図中0h)に対する%で表わした。各点および縦線は平均値±標準誤差を示す。

Fig. 3-9

偽妊娠ラットのダイアーナルPRLサージに対するOPC-4392単一投与の影響

偽妊娠第4日の15時(矢印)に、OPC-4392 5mg/kg(上段)または、0.1M乳酸(対照)(下段)を投与し、18時、21時に採血をした。
#は個体番号を示す。□は明期、■は暗期を表わす。

Fig. 3-10

偽妊娠ラットのノクターナルPRLサージに対するOPC-4392単一投与の影響

偽妊娠第4日の0時に、OPC-4392 5mg/kg(上段)または0.1M乳酸(対照)(下段)を投与し、3時、6時に採血をした。#は個体番号を示す。□は明期、■は暗期を表わす。

Fig. 3-11

偽妊娠ラットのノクターナルPRLサージに対するOPC-43922回投与の影響

偽妊娠第4日の0時と3時に、● OPC-4392 5mg/kgまたは○ 0.1M乳酸(対照)を2回投与し、5時より20時まで3時間毎に採血した。各点および縦線は平均値±標準誤差を示す。*、 $p < 0.05$ 、で対照群との間で有意差のあることを示す。

Treatment		PSP not interrupted
OPC-4392	5mg/kg×1 Day 4	7/7
"	5mg/kg×8 Day 4-5	4/4
"	30mg/kg×1 Day 4	6/6
"	30mg/kg×4 Day 4-5	6/6
"	30mg/kg×4 Day 7-8	6/6
CB-154	1.5mg/kg×1 Day 4	0/6
"	1.5mg/kg×1 Day 7	0/6

Table. 3-1

OPC-4392、CB-154の偽妊娠に対する影響
 OPC-4392、CB-154の投与方法、時間の詳細については材料と方法に記した。偽妊娠の中断は、膣スミアによって決定した。左には、OPC-4392、またはCB-154の投与量、回数、投与日を示した。右端に示した数値は、分母が各群の例数、分子が薬剤投与により偽妊娠が中断した動物数を示す。

A ♀

circadian oscillator

+stimulation
-inhibition

B ♂ ♀

Fig. 3-12

PRL分泌調節におけるDA支配系の模式図

♀ N (ノクターナル) サージ: サークadianオシレーターは、PRFニューロンを刺激、TIDAニューロンを抑制する(パネルA)。TIDAニューロンの抑制によって門脈血中のDAは減少するとともにDAによるPRFニューロンのシナプス後DAレセプターによる抑制が解除される。このPRFニューロンに対する抑制解除と、サーカディアンオシレーターによる刺激が同時に起こることによりPRFが分泌される。Nサージは、ラクトロフへのPRF刺激とシナプス前様DAレセプターを介したDA抑制の減少により発現する(パネルB)。

D (ダイアーナル) サージ: サークadianオシレーターは、TIDAニューロンの抑制にのみ作動する(パネルA)。したがって、門脈中のDAは減少する。PRFニューロンのDA抑制も解除されるが、サーカディアンオシレーターによる直接刺激が無いために、PRFは分泌されない。Dサージは、ラクトロフのDA抑制減少のみで発現する(パネルB)。

♂ TIDAニューロンにより、ラクトロフシナプス前様DAレセプターとPRFに存在するシナプス後レセプターを介して二重にPRL分泌を抑制している(パネルB)。

第 4 章 総括

下垂体PRL分泌は視床下部より分泌されるPRL放出促進因子(PRF)とPRL放出抑制因子(PIF)によって相反的に調節を受けているとされる。またステロイドなどの末梢ホルモンにも影響を受ける。哺乳類のPRL分泌調節は、著しく抑制支配優位にあり、現在では、その抑制支配の主体は、隆起漏斗部より下垂体門脈に分泌されるドパミン(DA)であり、ラクトロフに存在するDAレセプターを介してPRL分泌を調節しているとの説が主流である。DAを含めた多くのDAアゴニストやDAアンタゴニストがPRL分泌機序や生理的なPRL分泌動態の解析の有力な手段として用いられPRL分泌に対するDAの役割の追究に大きく貢献してきた。7-[3-[4-(2,3-dimethylphenyl)piperidinyl]propoxy]-2(1H)-quinolinone(OPC-4392)は、抗精神病薬として開発中の新規の化合物であるが、D2レセプターに選択性があり、さらにシナプス前DAレセプター(オートレセプター)にはアゴニストとして、シナプス後DAレセプターには、アンタゴニストとして作用するとされる。従来のDAアゴニストやアンタゴニストにはみられない特性を有する薬剤である。本研究は、ラットを用いて*in vitro*において下垂体PRL分泌に対するOPC-4392の作用の特異性を明らかにし、それをもとに*in vivo*においてPRFと下垂体レベルや中枢レベルでの相互作用も含めた、DA支配系PRL分泌調節機構の解析を行なった。

第1章 下垂体PRL分泌に対するOPC-4392の直接作用

下垂体静置培養系を用いて、代表的なDAアゴニスト、DAアンタゴニストと比較しつつ、OPC-4392のPRL分泌に対する影響を検討した。その結果、OPC-4392は、DA、DAアゴニストであるbromocriptine(CB

-154)、3-(3-hydroxyphenyl)-N-n-propylpiperidine (3-ppp)と同様に濃度依存的にPRL分泌を抑制し、その抑制の半最大有効濃度(ED50)は 10^{-9} Mオーダーで、 10^{-10} Mオーダーを示すCB-154よりは弱いもののDA、3-pppと同じオーダーで強いPRL分泌抑制作用を示した。また、DAアンタゴニストであるハロペリドールにおいても 10^{-5} Mの高濃度ではPRL分泌を強く抑制した。次にハロペリドールと、OPC-4392を下垂体培養細胞に作用させた結果、ハロペリドールは、それ自身PRL分泌を抑制しない濃度においてOPC-4392のPRL分泌抑制を濃度依存的に阻害した。また、DA、DAアゴニストであるアポモルフィンとOPC-4392を共存させて下垂体培養細胞に作用させた結果、OPC-4392は、高濃度においてわずかに、DAのPRL分泌抑制を阻害したものの、アポモルフィンのPRL分泌抑制を全く阻害しなかった。以上のことより、OPC-4392は、下垂体DAレセプターに対してほとんどアンタゴニスト作用を示さず、ハロペリドールによってOPC-4392のPRL分泌抑制効果が拮抗されることから、OPC-4392は下垂体DAレセプターにはアゴニストとして作用することが示された。したがって、下垂体DAレセプターは、DAニューロン終末のいわば、「後」にあるにもかかわらず、薬理的にはむしろオートレセプターの性質を持つことが示唆された。OPC-4392は、脳内においてはオートレセプターアゴニスト作用、およびシナプス後DAレセプターアンタゴニスト作用によりDA活性は抑制されるが、下垂体DAレセプターに対しては、本章の結果より、DA活性に対して促進的に働くことになり、脳内、下垂体両者に対して促進的、あるいは抑制的に働く従来のDAアゴニスト、または、アンタゴニストとは異なり、PRL分泌調節におけるDA系支配をより詳しく解析する上で非常に有用であることが示唆された。

本章では、マイクロキャリアに付着させた下垂体培養細胞をカラムに詰め、メディアムで連続的に灌流するsuperfusion法を用い、OPC-4392に加えて生理的PIFとしてDA、DAアゴニストとしてCB-154、さらには、生理的PRFとして、TRHをこれらと同時に作用させ、さらにOPC-4392のPRL分泌に対する特異性をより生理的条件に近い条件で検討した。本実験に用いたsuperfusionにおいては、DAに対する濃度依存的なPRL分泌抑制と、TRHにたいする大量のPRL分泌高進が観察された。Superfusion法におけるDA、CB-154、OPC-4392のPRL分泌にたいする影響は、静置培養とは異なり、量的のみならず質的にも異なると解釈される結果を示した。OPC-4392負荷によるPRL分泌抑制効果は弱く表現され、PRL分泌高進状態においては抑制効果がみられたもののTRHのPRL分泌高進作用に対しては、殆ど抑制効果を示さなかった。DAの負荷によっては急激にPRL分泌は減少したが、負荷終了後、比較的速やかにPRL分泌は、負荷前の値に回復した。またDA負荷中にTRHを作用させるとその時点でのTRHによるPRL分泌の上昇は起こらないが、DA負荷終了後、TRH単独負荷よりもはるかに大きいPRL分泌の高進が観察され、生体内におけるPRLの大量分泌にはこのようなメカニズムが存在している可能性が示唆された。CB-154は、負荷後速やかにPRL分泌を減少させ、さらには負荷終了後においてもPRL分泌は、長時間に渡って抑制されたままであった。さらにTRH作用時のPRL分泌高進も強く抑制しCB-154負荷終了後においてもDAにおいて観察されたPRLの大量分泌は全くみられず、生体内におけるCB-154の強力なPRL抑制作用には、単に門脈血中のDAの増加を再現したのみならず、PRFによる分泌刺激効果をも阻害している可能性も示唆された。

以上の結果より、1章の結果とも考え併せれば、OPC-4392はDAアゴニストでありながらCB-154とは異なり、TRHのようなPRFに対しては、PRL分泌抑制効果を示さないことが示唆され、この性質を利用することによって生理的なPRL分泌が、DAの減少によるものか、PRFの増加によるものかという問題を解決する手段となる可能性が示唆され、第1章で明らかとなった脳内DA系と下垂体DA系に対する解離と併せ、OPC-4392がPRL分泌調節機構の解析に有用であることがさらに示唆された。

第3章 生体におけるOPC-4392によるPRL分泌調節系の解析

実験的にPRL分泌を高進させたラット（レゼルピン投与ラット、auto-graftラット、isograftラット）の血中PRL濃度は、OPC-4392によって著しく抑制され生体内においても下垂体ラクトロフDAレセプターに対してOPC-4392はアゴニストとして作用することが確認された。しかしながら、正位即ち視床下部支配下にある下垂体を持つラット（レゼルピン投与ラット、isograftラット）は正位下垂体を持たないラット（autograftラット）に比べPRL分泌抑制時間の短縮が観察された。隆起漏斗系DAニューロンにはオートレセプターは存在しないとされていることから、この現象は、第2章で示唆された下垂体レベルでのOPC-4392では阻止できないPRFの分泌によるものと推定され、このPRF分泌はDA系による抑制されるPRF分泌機序がOPC-4392のシナプス後D2レセプターアンタゴニスト作用により解除された結果であると解釈された。正常ラットでは、血中PRL濃度はOPC-4392の投与によって変化しなかったが、OPC-4392によってPRFが分泌されても内生的DAによって、PRLは抑制されると考えられた。生理的PRL分泌相をもつ偽妊娠ラットにOPC-4392を大量、頻回に

投与してもCB-154とは異なり偽妊娠を中断させることができなかった。この原因を探るため、PRLダイアーナルサージまたは、ノクターナルサージの直前にOPC-4392を投与したところ、OPC-4392によってダイアーナルサージは阻止されるのに対し、ノクターナルサージは投与量を増やしても消失させることはできず、この結果偽妊娠が阻止できなかったものと判断された。したがって、ノクターナルサージ発現機序にはOPC-4392によっては、阻止できず、CB-154によっては阻止できる、すなわちPRFを解した機序が関与することが強く示唆され、CB-154は、下垂体レベルにおけるPRFのPRL分泌刺激作用の抑制に加えて、前述した、正位下垂体ラットを持つラットにおいての実験で推定されたDA系に抑制されるPRF分泌系をも抑制している可能性も考えられた。

以上によりOPC-4392を用いた解析によってDAは、下垂体に対する直接の抑制支配に加えて、脳内においてもPRF分泌を抑制することによって二重にPRL分泌を抑制的に支配していることが示唆された。

謝 辞

本論文の完成までに、終始御指導、御鞭撻賜りました高橋迪雄教授に、深甚なる謝意を表します。

御指導、御鞭撻賜りました本間運隆前教授に深謝致します。

貴重な御教示、御鞭撻を賜りました塩田邦雄助教授に深謝致します。

本研究の遂行並びに論文の作製に多大な御協力を戴きました獣医生理学教室の皆様にご心より御礼申し上げます。

本論文の作製に御便宜を賜りました清水直容教授（帝京大学医学部）に感謝致します。

本論文の作製に御協力戴いた帝京大学医学部付属市原病院動物室の皆様にご感謝致します。

OPC-4392を供与して戴きました菊池哲朗氏（大塚製薬）に感謝致します。

1. The first part of the paper discusses the general situation of the country and the position of the government in the field of foreign trade.

2. The second part of the paper discusses the general situation of the country and the position of the government in the field of foreign trade.

3. The third part of the paper discusses the general situation of the country and the position of the government in the field of foreign trade.

4. The fourth part of the paper discusses the general situation of the country and the position of the government in the field of foreign trade.

5. The fifth part of the paper discusses the general situation of the country and the position of the government in the field of foreign trade.

文献

1. The first part of the paper discusses the general situation of the country and the position of the government in the field of foreign trade.

2. The second part of the paper discusses the general situation of the country and the position of the government in the field of foreign trade.

3. The third part of the paper discusses the general situation of the country and the position of the government in the field of foreign trade.

4. The fourth part of the paper discusses the general situation of the country and the position of the government in the field of foreign trade.

5. The fifth part of the paper discusses the general situation of the country and the position of the government in the field of foreign trade.

Abe H, Engler D, Molitch ME, Bollinger-Gruber J, Peichilin S 1985 Vasoactive intestinal peptide is a physiological mediator of prolactin release in the rat. *Endocrinology* 116:1383

Aizawa T, Creer MA 1981 Delineation of the hypothalamic area controlling thyrotropin secretion in the rat. *Endocrinology* 109:1731

Ajika K, Kalra SP, Fawcett CP, Krulich L, McCann SM 1972 The effect of stress and nembutal on plasma levels of gonadotropins and prolactin in ovariectomized rats. *Endocrinology* 90:710

Andén NE, Dahlström A, Fuxe K, Hökfelt T 1966 The effect of haloperidol and chlorpromazine on the amine levels of central monoamine neurons. *Acta Physiol Scand* 68:419

Andén NE 1967 Effects of reserpine and a tyrosine hydroxylase inhibitor on the monoamine levels in different regions of the rat central nervous system. *European J Pharmacol* 1:1

Andrews WW, Ojida SR 1977 On the feedback action of estrogen on gonadotropin and prolactin release in infantile female rats, *Endocrinology* 101:1517

Barnes GD, Brown BL, Gard TG, Atkinson D, Ekins RP 1978 Effect of TRH and dopamine on cyclic AMP levels in enriched mammotroph and thyrotroph cells. *Mol Cell Endocrinol* 12:273

Bartke A, Lloyd CW 1970 Influence of prolactin and pituitary isografts on spermatogenesis in dwarf mice and hypophysectomized rats. *J Endocrinol* 49:311

Ben-Jonathan N 1985 Dopamine: A prolactin-inhibiting hormone. *Endocr Rev* 6:564

Ben-Jonathan N, Oliver C, Weiner HJ 1977 Dopamine in hypophysial portal plasma of the rat during estrous cycle and throughout pregnancy. *Endocrinology* 100:452

Besser GM, Thorner MO, Wass JAH, Mortimer CH, Yeo T 1977 Therapeutic use of bromocriptine and growth hormone release inhibiting hormone. *Prog Reprod Biol* 2:261

Bethea CL, Neill JD 1979 Prolactin secretion after cervical stimulation of rats maintained in constant dark or constant light. *Endocrinology* 104:870

Bhuta SI 1976 CB-154-[14C] absorption, blood level, and excretion in man. Sandoz

Boyd III AE, Spencer E, Jackson IMD, Reichlin S 1976 Prolactin-releasing factor (PRF) in porcine hypothalamic extract distinct from TRH. *Endocrinology* 99:861

Brodde OE 1982 Vascular dopamine receptors: Demonstration and characterization by in vitro studies. *Life Sci* 31:289

Brown EM, Attie MF, Reen S, Gardner DG, Kebabian J, Aurbach GD 1980 Characterization of dopaminergic receptors in dispersed bovine parathyroid cells. *Mol Pharmacol* 18:335

Butcher RL, Fugo NW, Collons WE 1972 Semicircadian rhythm in plasma levels of prolactin during early gestation in the rat. *Endocrinology* 90:1125

Butcher RL, Collins WE, Fugo NW 1974 Plasma concentration of LH, FSH, prolactin, Progesterone and estradiol-17beta throughout the 4day estrous cycle of the rat. *Endocrinology* 94:1704

Butler WR, Krey LC, Lu KH, Peckham WD, Knobil E 1975 Surgical disconnection of the medial basal hypothalamus and pituitary function in the rhesus monkey 4. prolactin secretion. *Endocrinology* 96:1099

Calabro MA, MacLoad RM 1978 Binding of dopamine to bovine anterior pituitary gland membranes. *Neuroendocrinology* 25:32

Caron MG, Beaulieu M, Paymond V, Gagné B, Drouin J, Lefkowitz RJ, Labrie F 1977 Dopaminergic receptors in the anterior pituitary gland. *J Biol Chem* 253:2244

Castro-Vasques A, Ojida SR, Krulich L, McCann SM 1981 Thyroid stimulating hormone release during the estrous cycle of the rat: variations in responsiveness to cervicovaginal stimulation. *Neuroendocrinology* 33:193

Clemens JA, Smalstig EB, Sawyer BD 1976 Studies on the role of the preoptic area in the control of reproductive function in the rat. *Endocrinology* 99:728

Cronin MJ, Roberts JM, Weiner RI 1978 Dopamine and dihydroergocriptine binding to the anterior pituitary and other brain areas of the rat and sheep. *Endocrinology* 103:302

De Greef WJ, Dullaart J, Zeilmaker GH 1977 Serum concentrations of progesterone, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone and prolactin in pseudopregnant rats: Effect of decidualization. *Endocrinology* 101:1054

De Greef WJ, Neill JD 1979 Dopamine levels in hypophysial stalk plasma of rat during surges of prolactin secretion induced by cervical stimulation. *Endocrinology* 105:1093

De Greef WJ, Voogt JL, Visser TJ, Lamberts SWJ, van der Schoot P 1987 Control of prolactin release induced by suckling. *Endocrinology* 121:316

Demarest KT, Moore KE 1979 Comparison of dopamine synthesis regulation in the terminals of nigrostriatal, mesolimbic, tuberoinfundibular and tuberohypophyseal neurons. *J Neural Transm* 46:263

Dikerman S, Clark J, Dickerman E, Meites J 1972 Effect of haloperidol on serum and pituitary prolactin and hypothalamic PIF in rats. *Neuroendocrinology* 9:332

Dohler KD, Wuttke W 1974 Total blockade of phasic pituitary prolactin release in rats: Effect on serum LH and progesterone during the estrous cycle and pregnancy. *Endocrinology* 94:1595

Enjalbert A, Ruberg M, Kordon C 1978 Neuroendocrine control of prolactin secretion. In: Pobyn C, Harter M (eds) *Progress in prolactin physiology and pathology*. Elsevier North Holland, Amsterdam p83

Enjalbert A, Bockaert J 1982 Pharmacological characterization of the D2 dopamine receptor negatively coupled with adenylate cyclase in rat anterior pituitary. *Mol Pharmacol* 23:576

Eriksson E, Modigh K, Carlsson A, Wikstrom H 1983 Dopamine receptors involved in prolactin secretion pharmacologically characterized by means of 3-ppp enantiomers. *European J Pharmacol* 96:29

Everett JW 1954 Luteotrophic function of autografts of the rat hypophysis. *Endocrinology* 54:685

Freeman ME, Banks JA 1980 Hypothalamic sites which control the surges of prolactin secretion induced by cervical stimulation. *Endocrinology* 106:668

Freeman ME, Smith MS, Nazian SJ, Neil JD 1974 Ovarian and hypothalamic control of the daily surges of prolactin secretion during pseudopregnancy in the rat. *Endocrinology* 94:875

Freeman ME, Sterman JR 1978 Ovarian steroid modulation of prolactin surges in cervically stimulated ovariectomized rats. *Endocrinology* 102:1915

Frükiger E, del Pozo E 1978 Influence on the endocrine system. In: Berde B, Shild HO (eds) *Ergot alkaloids and related compounds*. Springer Verlag, Heidelberg p615

Fuxe K 1963 Cellular localization of monoamines in the median eminence and the infundibular stem of some mammals. *Acta Physiol Scand* 58:383

Gibbs DM, Neill JD 1978 Dopamine Levels in hypophysial stalk blood in the rat are sufficient to inhibit prolactin secretion in vivo. *Endocrinology* 102:1895

Goodale DB, Pustephorz DB, Long JP, Flynn JR, Walsh B, Cannon JG, Lee T 1980 Neurochemical and behavioral evidence for a selective presynaptic dopamine receptor agonist. *Science* 210:1141

Gorski J 1981 Prolactin biosynthesis and its regulation by estrogens. In: Jaffe RB (ed) *Prolactin*. Elsevier, New York p57

Grosvenor CE, Whitworth N 1974 Evidence for a steady rate of secretion of prolactin following suckling in the rat. *J Dairy Sci* 57:900

Gudelsky GA, Moore KE 1976 Differential drug effects on dopamine concentration and rates of turnover in the median eminence, olfactory tubercle and corpus striatum. *J neural Transm* 38:95

Gudelsky GA, Porter JC 1980 Release of dopamine from tuberoinfundibular neurons into pituitary stalk blood after prolactin or haloperidol administration *Endocrinology* 106:526

Hafiez AA, Lloyd CW, Bartke A 1972 The role of prolactin in the regulation of testis function: the effects of prolactin and luteinizing hormone on the plasma level of testosterone and androstenedione in hypophysectomized rats. *J Endocrinol* 52:327

Herbert DC, Cisneros PL, Rennels EG 1977 Morphological changes in prolactin cells of the rat after testosterone administration. *Endocrinology* 100:487

Hjorth S, Carlsson A, Wikström H, Lindberg P, Sanchez P, Hacksell U, Arvidsson LE, Svenson U, Nilsson JLG 1981 3-PPP, a new centrally acting DA-receptor agonist with selectivity for autoreceptors. *Life Sci* 28:1225

Hökfelt T, Farrenkrug J, Tatemoto K, Mutt V, Werner S 1982 PHI a VIP like peptide is present in the rat median eminence. *Acta Physiol Scand* 116:469

Hökfelt T, Johanssen O, Goldstein M 1984 Chemical anatomy of the brain. *Science* 225:1326

本間運隆 1953 ダイコクネズミの下垂体摘出手術 医学と生物学
28:94

Joseph-Bravo P, Charri JL, Palacios JM, Kordon C 1979 Effect of neurotransmitters on the in vitro release of immunoreactive thyrotropin-releasing hormone from rat medio basal hypothalamus. *Endocrinology* 104:801

Kadota C, Ohta M, Takahashi M 1988 Dynamic response to follicle-stimulating hormone of secretion of progesterone by superfused rat ovarian granulosa cells. *Mol Cell Endocrinol* 59:213

Kamberi IA, Mical RS, Porter JC 1971 Effect of anterior pituitary perfusion and intraventricular injection of catecholamine on prolactin release. *Endocrinology* 88:1012

Kanematsu S, Sawyer CH 1973 Elevation of plasma prolactin after hypophysial stalk section in the rat. 93:238

Kannan CR 1987 The pituitary gland: Clinical surveys in endocrinology Vol 1. Plenum Publishing Corporation, New York

Kebabian JW, Calne DB 1979 Multiple receptors for dopamine. *Nature* 277:93

Kiuti K, Hirata Y, Minami M, Nagatu T 1987 Effect of 7-(3-[4-(2-3-dimethylphenyl)piperazinyl]propoxy)-2(1H)-quinolinone (OPC-4392), a newly synthesized agonist for presynaptic dopamine D2 receptor on tyrosine hydroxylation in rat striatal slices. *Life Sci* 42:343

Kusunoki M, Taniyama K, Tanaka C 1985 Dopamine regulation of [3H]acetylcholine release from guinea pig stomach. *J Pharmacol Exp Ther* 234:713

Langwr G, Sachar EJ, Gruen PH, Halperm FS 1977 Human prolactin responses to neuroleptic drugs correlate with antischizophrenic potency. *Nature* 266:639

Losonczy MF, Davidoson M, Davis KL 1987 The dopamine hypothesis of schizophrenia In: Meltzer HY (ed) *Psychopharmacology: The third generation of progress*. Raven Press, New York p715

Lowry PJ 1974 A sensitive method for the detection of corticotrophin releasing factor using a perfused pituitary cell column. *J Endocrinol* 62:163

Lowry PJ, McMartin C 1974 Measurement of the dynamics of stimulation and inhibition of steroidogenesis in isolated rat adrenal cells by using column perfusion *Biochem J* 142:287

MacLoad RM 1976 Regulation of Prolactin secretion. In: Martini L, Ganong WF (eds) *Frontiers in neuroendocrinology* Vol 4. Raven Press, New York p169

MacLoad RM, Lehmeyster JE 1974 Studies on the mechanism of the dopamine-mediated inhibition of prolactin secretion. *Endocrinology* 94:1077

Matsuda J, Noda K, Shiota K, Takahashi M 1990 Participation of ovarian 20alpha-hydroxysteroid dehydrogenase in luteotrophic and luteolytic process during rat pseudopregnancy. *J Reprod Fert* 88:467

McCann SM 1982 The role of brain peptides in control of anterior pituitary hormone secretion. In: Muller EE, MacLoad RM (eds) *Neuroendocrine perspective*. Elsevier Biomedical Press p1

Meites J 1973 Control of prolactin secretion in animals. In: Pasteels JG, Pobyn C (eds) Human prolactin. Excerpta Medica Amsterdam p105

Meltzer HY, Fang VS 1976 The effect of neuroleptics on serum prolactin in schizophrenic patients. Arch Gne Psych 33:279

Melter HY, Simonovic M 1981 Effect of 3-ppp, a putative dopamine autoreceptor agonist, on serum prolactin levels. Life Sci 99:105

Moore KE 1987 Interactions between prolactin and dopaminergic neurons. Biol Reprod 36:47

Moore KE, Wuerthele SM 1979 Regulation of nigrostriatal and tuberoinfundibular hypophyseal dopaminergic neurons. Prog Neurobiol 13:325

Moore RY, Bloom FE 1978 Central catecholamine neuron systems. Ann Rev Neurosci 1:129

Murakami N, Takahashi M, Suzuki Y, Homma K 1982 Responsiveness of dispersed rat luteal cells to luteinizing hormone and prolactin during the estrous cycle and early pseudopregnancy. Endocrinology 111:500

Nagatu T, Levitt M, Udenfriend S 1964 Tyrosine hydroxylase: The initial step in norepinephrine biosynthesis. J Biol Chem 239:2910

Nakai Y, Shioda S, Ochiai H, Kondo J, Hashimoto A 1983 Ultrastructural relationship between monoamine- and TRH-containing axons in the rat median eminence as revealed by combined autoradiography and immunocytochemistry in the same tissue section. Cell tissue Res 230:1

Neill JD 1980 Neuroendocrine regulation of prolactin secretion. In: Martini L, Ganong WF (eds) Frontiers in neuroendocrinology Vol 6. Raven Press, New York p129

Onalli P, Schwartz JP, Costa E 1981 Dopaminergic modulation of adenylate cyclase stimulation by vasoactive intestinal peptide in anterior pituitary. Proc Natl Acad Sci 78:6531

Pasteels JL 1961 Sécrétion de prolactine per l'hypophyse en culture de tissus. C R Acad Sci Ser D 253:2140

Richelson E 1980 Neuroleptics and neurotransmitter receptors. Psychiat Ann 10:459

Rosenzweig LJ, Kanwer YS 1982 Dopamine internalization by and intracellular distribution within prolactin cells and somatotrophs of the rat anterior pituitary as determined by quantitative electron microscopic autoradiography. Endocrinology 111:1817

Roth RH 1979 Dopamine autoreceptors: Pharmacology, function and comparison with postsynaptic dopamine receptors. *Cmmun Psycopharmacol* 3:429

Said SI, Porter JC 1979 Vasoactive intestinal polypeptide: release into hypophyseal portal blood. *Life Sci* 24:227

Seeman P 1981 Brain dopamine receptors. *Pharmacol Rev* 32:229

Seeman P 1987 Dopamine receptors and dopamine hypothesis of schizophrenia. *Synapse* 1:133

Shaar CJ, Clemens JA 1974 The role of catecholamines in the release of anterior pituitary prolactin in vitro. *Endocrinology* 95:1202

Shimatsu A, Kato Y, Inoue T, Christofides ND, Bloom S, Imura H 1983 Peptide histidine isoleucine and vasoactive intestinal polypeptide-like immunoreactivity coexist in rat hypophysial portal blood. *Neurosci Letter*

Shimatsu A, Kato Y, Matsushita N, Kitakami H, Yanaihara N, Imura H 1981 Immunoreactive vasoactive intestinal polypeptide in rat hypophysial portal blood. *Endocrinology* 108:395

Shin SH, Aiken RB, Roberts R, Howitt C 1974 Effect of testosterone on serum prolactin in the castrated rat. *J Endocrinol* 63:257

Shiota K, Yoshida K, Noguchi C, Nagayama R 1984 In vitro Thyrotrophin release with thyrotrophin releasing hormone and an analogue, DN-1417. *Acta Endocrinol* 106:71

Skirboll LR, Grace AA, Bunney BS 1979 Dopamine auto- and postsynaptic receptors: electrophysiological evidence for differential sensitivity to dopamine agonists. *Science* 206:80

Smith MA, Vale WW 1980 Superfusion of rat anterior pituitary cells attached to cytodex beads: validation of a technique. *Endocrinology* 107:1425

Smith MS, Freeman NE, Neill JD 1975 The control of progesterone secretion during the estrous cycle and early pseudopregnancy in the rat: prolactin, gonadotropin and steroid levels associated with rescue of the corpus luteum of Pseudopregnancy. *Endocrinology* 96:219

Stevens E, Helfenstein JE 1966 Some effects of certain naturally occurring oestrogens on the anterior pituitary glands of the rats. *Nature* 211:879

Stoof JC, Kebebian JW 1984 Two dopamine receptors: biochemistry, physiology and pharmacology. *Life Sci* 35:2281

Strömbom U 1975 On the functional role of pre- and postsynaptic catecholamine receptors in brain. Acta Physiol Scand Suppl 431:1

鈴木善祐 高橋迪雄 1979 妊娠のホルモン制御 - 哺乳動物 - 代謝
謝 臨時増刊「性」 Vol116: 473

Swennen L, Denef C 1982 Physiological concentrations of dopamine decrease adenosine 3',5'-monophosphate levels in cultured rat anterior pituitary cells and enriched populations of lactotrophs: evidence for a causal relationship to inhibition of prolactin release. Endocrinology 111:398

Talwalker PK, Patner A, Meites J 1963 In vitro inhibition of pituitary prolactin synthesis and release by hypothalamic extract. Am J Physiol 205:213

田中千賀子 白川治 1985 ドーパミンレセプター 代謝 22:113

寺井道夫 臼田眞治 前野弘夫 1984 ドーパミン受容体 蛋白質
核酸酵素 29:1328

Van Rossum JM 1966 The significance of dopamine-receptor blockade for the mechanism of action of neuroleptic drugs. Arch Int Pharmacodyn Ther 160:492

Voogt JJ, Meites J 1971 Effect of an implant of prolactin in median eminence of pseudopregnant rats on serum and pituitary LH, FSH and prolactin. Endocrinology 88:286

Yasuda Y, Kikuchi T, Suzuki S, Tsutsui M, Yamada K, Hiyama T 1988 7-[3-(4-[2,3-dimethylphenyl]piperazinyl)propoxy]-2(1H)-quinolinone(OPC-4392), A presynaptic dopamine autoreceptor agonist and postsynaptic D2 Receptor antagonist. Life Sci 42:1941

Werner S, Hulting AL, Hökfelt T, Eneroth P, Tatemoto K, Mutt V, Moroder L, Wunsch E 1983 Effect of the peptide PHI-27 on prolactin release in vitro. Neuroendocrinology 37:476

Kodak Color Control Patches

© Kodak, 2007 TM, Kodak

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM, Kodak